



Patologia sistemului genital feminin.

Tema: Patologia sistemului genital masculin. Patologia sistemului genital feminin.

I. Micropreparate:


№ 227. Adenocarcinom acinar de prostată. (colorație H-E). Indicații:

1. Structuri glandulare atipice.
2. Glande dilatate chistic de formă neregulată
3. Glande neoplastice cu invazie perineurală.

În micropreparat sunt prezente aglomerări de glande canceroase mici, deformate, dispuse compact, „spate la spate”, în glande lipsesc invaginările papilare, stroma interglandulară săracă. Glandele sunt alcătuite dintr-un singur strat de celule epiteliale cubice sau cilindrice, colorate intens bazofil, nucleele mărite, cu nucleolii evidenți, lipsa stratului de celule bazale (în normă prezent în glandele benigne). Se observă invazia perineurală (înconjoară nervul periferic). Printre insulele de glandele atipice, este prezentă glandă dilatată chistic, de formă neregulată, în stromă - infiltrat inflamator cronic, predominant limfoid.

Cancerul de prostată este a doua dintre cele mai frecvente forme de cancer la bărbați, după cancerul pulmonar, mai ales în grupurile de vârstă avansată. De regulă, se dezvoltă la bărbații peste 50 de ani. Macroscopic prostata poate fi mărită în dimensiuni sau normală, uneori chiar mai mică decât în normă, consistența densă. În 95% de cazuri se localizează în zonele periferice ale prostatei, predominant în lobul posterior, spre deosebire de hiperplazia nodulară benignă (HNBp), care se produce în regiunea internă periuretrală. În 15-20% de cazuri hiperplazia nodulară a prostatei se asociază cu cancer. Se consideră, că la 50% de bărbați peste 80 de ani este cancer asimptomatic (latent) de prostată. Cea mai frecventă variantă histologică (96%) este adenocarcinomul. Un rol important în diagnosticul cancerului prostatic o are puncția-biopsie.

Complicații: *invadarea veziculelor seminale, a peretelui vezicii urinare, rectului, țesuturilor moi adiacente. Metastazarea pe cale limfogenă are loc în nodulii limfatici pelvieni, iliaci, paraaortali și hematogene – în oase (bazinul, coloana vertebrală), plămâni, rinichi, creier.*



№ 227. Adenocarcinom acinar de prostată. (colorație H-E).


№ 214. Seminom testicular. (*colorație H-E*).

Indicații:

1. Celule tumorale de formă poligonală cu citoplasma clară.
2. Infiltrate limfoide în fasciculele fibroconjunctive.

Nodul tumoral are structură lobulară, este constituit din celule mari rotunde sau poligonale bine conturate, cu citoplasma clară datorită conținutului bogat de glicogen, nucleeele cu cromatina repartizată neuniform, au aspect granular, 1-2 nucleoli proeminenți, se observă mitoze patologice; aglomerările celulare sunt separate de septuri fibroconjunctive subțiri cu infiltrat limfocitar (limfocite T) și plasmocite, pot fi centri germinativi; se observă focare mici de necroză.

Seminomul este cea mai frecventă tumoare malignă din celule germinale (~50% din numărul total de tumori germinogene) și cea mai frecventă tumoare testiculară. Histologic este identic cu disgerminomul ovarian. Se întâlnește la bărbați tineri de la 30 la 49 ani, este rară până la pubertate și după 70 de ani. Este o tumoare unilaterală, macroscopic prezintă unul sau mai mulți noduli tumorali de consistență moale, elastică, pe secțiune de culoare cenușie deschisă, pot fi focare mici de necroză și hemoragii. Primele metastaze apar în nodulii limfatici retroperitoneali, ulterior în cei mediastinali și cervicali, metastazele viscerale se dezvoltă tardiv, mai frecvent în plămâni. Principalii factori de risc: predispoziția familială, criptorhidismul, disgenezie gonadală.



№ 214. Seminom testicular. (colorație H-E).


No 108. Sarcină tubară. (*colorație H-E*).

Indicații:

1. Viloziități coriale.
2. Țesut decidual.
3. Peretele trompei uterine.

În lumenul trompei uterine se observă viloziități coriale de formă și dimensiuni variabile, acoperite cu epiteliu bistratificat, stratul intern de celule cuboidale – citotrofoblastul și stratul extern de celule polimorfe, unele gigante, polinucleate, cu nuclee hipercrome – sincițiotrofoblastul, stroma viloziităților este edemațiată. Sunt aglomerări de celule deciduale poligonale cu citoplasma clară, focare de necroză, hemoragii. În locul implantării ovulului fertilizat se constată penetrarea țesutului trofoblastic cu celule coriale multinucleate în peretele tubar, înlocuind mucoasa și stratul circular al muscularei, fiind păstrat doar stratul longitudinal. În perete - edem, dilatarea și hiperemia vaselor, hemoragii. Sunt zone intacte ale peretelui tubar (*de nu confundat viloziitățile mucoasei trompei uterine cu viloziitățile coriale!*).

Sarcina tubară este cea mai frecventă formă de sarcină ectopică, în care trecerea ovulului fertilizat prin trompele uterine este întârziată și implantarea se produce în afara corpului uterului. Datorită infiltrării peretelui trompei cu țesut trofoblastic are loc erodarea vaselor sanguine și hemoragie în lumenul trompei – hematosalpinx, iar pe măsura creșterii embrionului se produce distensia trompei și ruptura peretelui cu hemoragie intraperitoneală. În endometru este prezentă reacție deciduală.



№108. Sarcină tubură (colorație H-E).


No 111. Coriocarcinom uterin (colorație H-E).

Indicații:

1. Celule epiteliale ale citotrofoblastului cu citoplasma clară (celule Langhans).
2. Celule atipice sincițiale cu hiperchromia nucleelor.
3. Focare hemoragice.

În micropreparat se constată țesut tumoral compact, constituit din 2 componente: celule citotrofoblastice și sincițiotrofoblastice anaplazice, care provin din epiteliul corial. Celulele tumorale sunt dispuse haotic, în diferite proporții, vilozitățile coriale lipsesc. Este prezent un polimorfism celular și nuclear marcat. Celulele citotrofoblastice au citoplasma clară, nucleul slab colorat, iar celulele sincițiotrofoblastice variază după formă și dimensiuni, nucleeele intens bazofile, hiperchrome, se întâlnesc celule gigante polinucleate, figuri de mitoză. În tumoare lipsește stroma, vasele sanguine sunt tapetate cu celule tumorale, se observă zone extinse de necroză și hemoragii.

Coriocarcinomul este o tumoare malignă a trofoblastului, care se dezvoltă din mola hidatiformă completă (50%), din resturile placentare după avort (25%), după naștere normală (20%) sau din sarcina ectopică (5%). Este o tumoare foarte agresivă, invazivă, care metastazează rapid pe cale hematogenă cu metastaze în plămâni (80%), vagin (30%), creier (10%), ficat (10%), rinichi. Metastazele limfogene nu sunt caracteristice. La etapa incipientă țesutul tumoral pătrunde în miometru și vasele sanguine. Tumoarea se deosebește prin sensibilitate remarcabilă la chimioterapie, chiar și a metastazelor.



№ 111. Coriocarcinom uterin (colorație H-E).

II. Macropreparate :

№ 90. Hiperplazia nodulară a prostatei cu hipertrofia peretelui vezicii urinare.

Prostata este mărită în dimensiuni, are aspect nodular, consistență densă, proeminează în cavitatea vezicii urinare. Peretele vezicii urinare este îngroșat, hipertrofiat, mucoasa are aspect trabecular. Hipertrofia peretelui vezical are caracter compensator datorită comprimării porțiunii prostatice a uretrei și retenției de urină.

Hiperplazia nodulară a prostatei este un proces dishormonal, care se produce morfologic prin proliferarea a 3 tipuri de țesuturi: glandular, fibroconjunctiv și muscular neted în proporții variabile. Prostata este mărită în dimensiuni, masa până la 100 g și mai mult (norma 20-25 g), cu structură nodulară, pe secțiune nodulii au consistență solidă sau pot conține cavități chistice (glande dilatate).

Se pot asocia infecții urinare cu dezvoltarea cistitei, ureteritei și pielonefritei ascendente, a prostatitei, orhoepididimitei, hidroureterului și hidronefrozei. În cazurile de stază urinară îndelungată pot apărea calculi în vezica urinară.



№ 90. Hiperplazia nodulară a prostatei cu hipertrofia peretelui vezicii urinare.



№ 105. Carcinom de corp uterin.

În cavitatea uterină se găsește un nod tumoral cu creștere exofită, care umple aproape în întregime cavitatea, are suprafața rugoasă, neregulată, culoarea pe secțiune cenușie-albicioasă, consistența friabilă.

Carcinomul de corp uterin se întâlnește mai frecvent în perioada de vârstă de 60-70 de ani, în perioada de menopauză, dar poate să apară și la femei tinere. Precursorii principali sunt hiperplazia glandulară fără atipie a endometrului (1-3%) și deosebit de frecvent - hiperplazia glandulară atipică/neoplazia endometrială intraepitelială, care coexistă cu carcinomul în 25-40% de cazuri. Variantele histologice cele mai frecvente ale carcinomului endometrial sunt carcinomul endometrioid (70-80%), mucinos și seros. Tumoarea poate crește difuz sau exofit, în nodul tumoral pot surveni modificări secundare, focare de necroză, ulceratie, inflamație. Carcinomul de corp uterin poate infiltra miometrul, parametrul, colul uterin, vaginul, vezica urinară, colonul. Cele mai frecvente metastaze apar în nodulii limfatici pelvieni, para-aortali, inghinali. Metastazele hematogene se observă în plămâni, ficat, oase, alte organe.

№ 106. Carcinom de col uterin.

În colul uterin se observă un nod tumoral cu creștere exo-endofită, care infiltrează peretele cervical, de formă neregulată, cu limitele imprecise, suprafața rugoasă, nodulară, culoarea cenușie-gălbui.

Carcinomul de col uterin ocupă locul 2-3 în totalitatea de cancere la femei. Se întâlnește mai frecvent în vârsta medie de 55 ani. Este precedat în majoritatea absolută a cazurilor de infecția HPV, îndeosebi serotipurile 16 și 18, HPV 16 cauzând carcinomul scuamos și HPV 18 – adenocarcinomul cervical. Manifestările morfologice ale infecției papilomavirotice sunt leziunea scuamoasă intraepitelială, care poate fi de grad redus și de grad înalt (LSIL și HSIL). Formele histologice predominante ale carcinomului de col uterin sunt carcinomul scuamocelular keratinizat sau nekeratinizat (~ 70%) și adenocarcinomul (10-25%). Macroscopic carcinomul porțiunii vaginale a colului uterin crește mai frecvent exofit, iar carcinomul canalului cervical – endofit. Tumoarea poate să invadeze peretele cervical, vaginul, țesuturile și organele pelviene adiacente, de ex., vezica urinară, rectul. Metastazele limfogene apar în nodulii limfatici pelvieni, retroperitoneali, inghinali, iar hematogene – în plămâni, ficat, alte organe.



№ 105. Carcinom de corp uterin.



№ 106. Carcinom de col uterin.

№ 108. Sarcină tubară.

Trompa uterină este dilatată, diametrul până la 2-3 cm, formă elipsoidă, pe secțiune se observă cheaguri de sânge, fragmente de țesut placentar și resturi fetale de culoare cenușie.

Sarcina ectopică constituie aproximativ 1% din numărul total al sarcinilor, iar localizarea tubară este cea mai frecventă – mai mult de 90%. Mult mai rar se întâlnește sarcină ovariană și abdominală. Sarcina tubară este, de obicei unilaterală, fiind cauzată de salpingite, anomalii congenitale ale trompei, endometrioză, tumori, inclusiv tumori uterine, care periclitizează procesul de migrare a ovulului fecundat spre cavitatea uterină.

Salpingitele se soldează cu procese de fibroză și deformarea ulterioară a trompelor. Localizarea mai frecventă este în regiunea ampulară a trompei, mult mai rar în cea interstițială la nivelul cornului corpului uterin. Sarcina tubară în dinamică evoluează spre ruptura peretelui, care se produce brusc, cu tablou clinic de abdomen acut și hemoragie intraperitoneală cu șoc hemoragic. În unele cazuri embrionul este detașat de la peretele tubar, moare și este expulzat în cavitatea peritoneală prin porțiunea fimbriată a trompei – avort tubar. Embrionul/fătul mort în cavitatea abdominală se poate mumifica (făt papiraceu) sau calcifica (lithopedion). Aceleași modificări pot surveni în embrionul/fătul, care este eliminat în cavitatea abdominală prin ruptura trompei.


№ 111. Chist ovarian dermoid.

Macropreparatul prezintă o formațiune chistică umplută cu sebum, păr, are un aspect spongios, culoarea albă-gălbuie, ocazional pot fi focare de os, cartilaj, dinți.



Chisturile dermoide sunt o variantă a teratoamelor ovariene mature, care derivă din celulele germinale ale celor 3 foițe embrionale: ectodermul, entodermul și mezodermul. Reprezintă 15-20% din tumorile ovariene, în special la femei tinere, de obicei unilaterale. În majoritatea absolută a cazurilor sunt tumori benigne, iar aproximativ în 1% se pot maligniza, de obicei carcinom scuamocelular.





№ 108. Sarcină tubară.



№ 111. Chist ovarian dermoid.




Adenocarcinom de prostată pe fond de hiperplazie glandulară.




**Seminom
testicular.**

Carcinom testicular embrionar. (pattern solid).




Solid tumor with gelatinous surface



A

**Tumora de sac Yolk
(sac vitelin) testiculară.
(pattern microchistic).**

Yolk sac tumor: microcystic pattern



B

Hemorrhagic tumor





A

Coriocarcinom testicular.

1. Citotrofoblast.
2. Sincitiotrofoblast.

©WebPathology.com






Heterogeneous or variegated tumor
due to different elements

A

Mature teratoma

Teratom testicular matur.



B


Mature teratoma




More fleshy appearing than mature teratoma

C



Immature teratoma

Teratom testicular imatur.










**Hiperplazie simplă și
complexă a endometrului.**




Polip endometrial.




**Carcinom endometrial,
varianta endometrioidă.**






Leiomiom uterin.





Leiomyosarcom.











**Neoplazie intraepitelială
cervicală (koilocitoză). HSIL (CIN 2,3).**




Cancer de col uterin.
(*histologic – carcinom scuamos
cu keratinizare*).




**Cyst ovarian seros
(cystadenoma seros).**







**Tumoare ovariana borderline tip seros.
Carcinom seros de ovar.**





**Ovarian mucinous cystadenoma.
(mucinous cystadenoma)**





Carcinom mucinos ovarian. ↑
(*chistadenocarcinom mucinos*)





Chist endometriotic ovarian.
(ciocolațiu)



Sarcină ectopică ovariană.

**Sarcină ectopică
intraperitoneală.**





Molă hidatiformă.

Gross appearance of invasive mole. A hemorrhagic mass has permeated half of the thickness of the myometrial wall.



Molă disecantă.

Choriocarcinoma

Dissemination to lung



Choriocarcinom cu diseminare în plămâni.



**Choriocarcinom
gestațional.**

Testiculele și epididimului.

ANOMALII CONGENITALE

- Criptorhidie (testicule necoborâte în scrot);
- Lipsa unuia sau a ambelor testicule;
- Sinorhism (fuziunea testiculelor).

Testiculele și epididimului.

ANOMALII CONGENITALE


Criptorhidism - apare la $\sim 1\%$ dintre băieții cu vârsta de 1 an. Această anomalie se caracterizează prin testicule nescrise complete sau parțiale din cavitatea abdominală în scrot. De obicei, această patologie este o malformație izolată, dar poate fi combinată cu alte malformații ale tractului genitourinar, de exemplu, hipospadie.



Testiculele și epididimului.

ANOMALII CONGENITALE


•La majoritatea pacienților, testiculele necoborâte pot fi palpate în canalul inghinal. Criptorhidia este rareori asociată cu o tulburare hormonală pronunțată. Criptorhidia este complet asimptomatică și este detectată accidental fie de pacientul însuși, fie de un medic care la examinare constată că nu sunt testicule în scrot.



Testiculele și epididimului.

ANOMALII CONGENITALE


•**Morfologie.** Criptorhidismul este de obicei unilateral (75%). Modificările histologice ale testiculelor necoborâte încep nu mai devreme de vârsta de 2 ani și se caracterizează prin afectarea dezvoltării celulelor germinale din cauza hialinozei severe și îngroșării membranei bazale a tuburilor seminiferi. Ca urmare, tubii sunt transformați în benzi dense de țesut conjunctiv hialin înconjurat de membrane bazale pronunțate.



Testiculele și epididimului.

ANOMALII CONGENITALE


•Odată cu atrofierea progresivă a tubilor, testiculele necoborâte devin mici și dense ca urmare a modificărilor sclerotice. La bărbații cu criptorhidism unilateral, modificările histologice asociate cu deficiența de celule germinale sunt de asemenea observate în testicul descendent contralateral.



Testiculele și epididimului.

ANOMALII CONGENITALE

•În 10-20% din cazuri, criptorhidia este însoțită de hernie inghinală. În plus, în testiculele necoborâte, riscul de dezvoltare a tumorilor maligne este crescut. În cele mai multe cazuri, testiculele situate în canalul inghinal coboară în scrot de sinestatător în primul an de viață. Dacă acest lucru nu se întâmplă, este necesară corecția chirurgicală la vârsta de aproximativ 2 ani (înainte de apariția modificărilor histologice). Orhidopexia (fixarea chirurgicală a testiculelor în scrot) nu garantează fertilitatea, 10-60% dintre pacienții supuși repositiei chirurgicale a testiculelor au tulburări de spermatogeneză, dar riscul de dezvoltare a cancerului este redus (motivul nu este clar).



Testiculele și epididimului.

Torsiunea testiculului

• Torsiunea cordonului spermatic duce de obicei la încetarea fluxului venos din testicul. Arterele cu pereți groși rămân pasabile, ceea ce duce la o congestie vasculară severă, care poate provoca infarct hemoragic. Există două tipuri de torsiune testiculară:

- *neonatal*;
- *la adulți*.



Torsiunea testiculului la adulți, în contrast cu torsiunea neonatală, este rezultatul unui defect anatomic bilateral în care testiculul capătă o mobilitate crescută (*anomalie de tipul - în limbă de clopot*).

Clasificarea principalelor tumori testiculare:

Tumori cu celule germinale

Tumori seminomice

- Seminomul
- Seminomul spermatocitic

Tumori non-seminomice

- Carcinomul embrionar
- Tumora de sac vitelin (sinus endodermic)
- Coriocarcinom
- Teratom

Tumori stromei cordonului sexual

- Tumora cu celule Leydig
- Tumora cu celule Sertoli


Tumorile cu celule germinale constituie ~ 95% din tumorile testiculare.

Asociate cu o serie de afecțiuni cunoscute sub numele de sindrom de disgenezie testiculară:

- criptorhidism
- hipospadie
- tulburarea spermatogenezei

Principalul factor de risc este criptorhidismul, care este asociat cu dezvoltarea tumorilor cu celule germinale ale testiculului în 10% din cazuri.


•Sindromul Klinefelter, ale cărui manifestări clinice sunt similare cu cele ale sindromului de disgenezie testiculară, este asociat cu un risc semnificativ crescut (de 50 de ori în comparație cu populația generală) de dezvoltare a tumorilor mediastinale germinale, dar acești pacienți nu dezvoltă tumori testiculare.



Seminomul

Printre tumorile din celule germinale, cele mai frecvente sunt seminoamele (~ 50%).

Morfologie. Dacă seminomul este format dintr-o populație de celule, se numește *clasic* sau *tipic*. Mărimea seminomului este uneori de 10 ori mai mare decât a unui testicul normal.





Seminomul testicular. O formațiune pală, cărnoasă, omogenă destul de bine delimitată.

Tumori testiculare



Seminomul

- Microscopic, seminomul clasic este format din grupuri de același tip de celule, divizate în segmente slab delimitate de septuri subțire de țesut conjunctiv care conține o cantitate moderată de limfocite. Celulele seminomului clasic sunt mari rotunde sau poligonale, au o membrană celulară evidentă, citoplasmă clară sau apoasă cu un nucleu mare, localizat central, cu unul sau doi nucleoli pronunțați. Citoplasma conține cantități variabile de glicogen.
- Aproximativ 15% din seminoame conțin sincitiotrofoblaste. La astfel de pacienți, nivelul de hCG este ridicat, dar nu este comparabil cu cel din coriocarcinom.




Seminomul

•Seminomul spermatocitic se referă la tumorile seminomice, dar are semne clinice și histologice deosebite, este rar și reprezintă 1-2% din toate tumorile cu celule germinale ale testiculului. Incidența maximă apare la o vârstă mai înaintată, comparativ cu alte tumori testiculare: vârsta medie este de peste 65 de ani. Spre deosebire de seminomul clasic, seminomul spermatocitic se caracterizează printr-o creștere lentă și nu metastazează, ceea ce indică un prognostic favorabil. Alte diferențe între seminomul spermatocitelor și seminomul clasic: absența limfocitelor, granuloamelor, sincitotrofoblastelor, localizări extra-testiculare, combinație cu alte tumori germinogene.




Carcinomul embrionar

- Carcinomul embrionar este observat în principal la pacienții cu vârstă cuprinsă între 20-30 de ani. Această tumoră este mai agresivă decât tumorile seminomice.
- Macroscopic, această tumoră este mai mică decât tumorile seminomice și de obicei nu afectează întregul testicul. Pe secțiune, carcinomul embrionar se caracterizează printr-o suprafață pestriță, contururi neclare și prezența focarilor de hemoragii și necroze.



Carcinomul embrionar

- Celulele tumorale sunt mari, nediferențiate, cu nuclei hipercromi și nucleoli proeminenți, arată ca celulele epiteliale. Limitele celulare din carcinomul embrionar (spre deosebire de seminom) sunt de obicei neclare, există diferențe semnificative în forma și dimensiunea celulelor și nucleelor. Adesea se evidențiază figuri mitotice și celule gigante tumorale.



Tumără de sac vitelin

•Tumorile sacului vitelin (tumorile sinusului endodermal) sunt cele mai frecvente tumori testiculare la sugari și copii sub 3 ani. În această grupă de vârstă, aceste tumori au un prognostic foarte bun. La adulți, formele izolate ale acestor tumori sunt rare, deoarece componentele tumorii sacului vitelin sunt adesea combinate cu carcinomul embrionar.




Tumori testiculare

Tumora de sac vetilin

•Tumora nu are o capsulă, pe secțiune este omogenă, mucinoasă, de culoare alb-gălbuie. La examinarea microscopică, o trăsătură caracteristică este rețeaua de „dantelă” cu celule cubice sau plate de dimensiuni medii. În plus, sunt determinate structurile papilare, cordoane de celulare individuale. În „50% din tumori, există structuri similare cu sinusurile endodermice, *corpusculi Schiller-Duval*.

Ele constau dintr-un nucleu mezodermic.
cu un capilar central și straturi de celule
viscerale și parietale
care amintesc **glomerulul primitiv**.



Schiller-Duval body

Tumori testiculare

Coriocarcinomul


- Se referă la tumorile testiculare de grad înalt de malignitate. coriocarcinomul pur este rar și reprezintă mai puțin de 1% din toate tumorile cu celule germinale.
- **Morfologie.** Coriocarcinomul are de obicei aspectul unui nodul mic palpabil și nu duce la mărirea testiculului. Aceste tumori depășesc rareori diametrul de 5 cm. Este caracteristică prezența hemoragiilor și necrozei.



Tumori testiculare

Coriocarcinomul

- *Celulele sincitiotrofoblaste* sunt de dimensiuni mari au nuclee hipercrome neregulate sau lobate și citoplasmă vacuolizată eozinofilă abundentă, în care se poate determina cu ușurință hCG.
- *Celulele citotrofoblaste* sunt mai ordonate și au o formă predominant poligonală, limite bine conturate și o citoplasmă clară. Aceste celule sunt localizate sub formă de benzi sau cuiburi și conțin nuclee unice, identice.



Tumori testiculare

Teratomul

- Teratomul este o tumoră cu o structură complexă și constă din diverse componente celulare sau organoide care seamănă cu derivații mai multor straturi germinale. Teratoamele pot apărea la orice vârstă. Teratoamele „pure” sunt adesea întâlnite la copiii mici și de vârstă mijlocie, la adulți, teratoamele „pure” sunt rare (2-3% din toate tumorile cu celule germinale). Frecvența teratoamelor combinate cu alte tumori germinogene ajunge la ~ 45%.



Tumori testiculare

Teratomul

•Teratomele, de regulă, sunt tumori mari (5-10 cm). Macroscopic, tumora are un aspect eterogen, care depinde de țesuturile sale constitutive, incluzând componente solide, cartilaginoase și chistice. Prezența hemoragiilor și focarelor de necroză indică de obicei o combinație de teratom cu carcinom embrionar și / sau coriocarcinom.



Tumori testiculare

Teratomul

•Teratomele constau din grupuri aleatorii de celule diferențiate sau structuri organoide, cum ar fi țesut nervos, fibre musculare, insule cartilaginose, zone cu epiteliu scuamos, structuri asemănătoare cu țesut tiroidian, epiteliu bronșic și bronșiolic, epiteliu peretelui intestinal sau țesut cerebral.



Tumori testiculare

Teratomul


- Elementele pot fi mature (asemănătoare diferitelor țesuturi formate) și imature (cu semne histologice ale țesutului fetal sau embrionar).
- Rareori, într-un teratom se pot dezvolta tumori maligne non-germinogene. Acest fenomen este observat în cazul teratomului cu transformare malignă, atunci când malignizarea apare la derivații unuia sau mai multor straturi germinale. Astfel, se formează focare de carcinom cu celule scuamoase, adenocarcinom producător de mucină sau sarcom.



Tumori testiculare

Tumori mixte

•Aproximativ 60% din tumorile testiculare au mai multe tipuri histologice. Combinații tipice: teratom + carcinom embrionar + tumora de sac vitelin, seminom + carcinom embrionar, carcinom embrionar + teratom (teratocartiom). Prognosticul se agravează în prezența unui element malign agresiv într-o tumoră mixtă.



Mixed GCT (70% teratoma, 30% embryonal carcinoma)

Tumori testiculare

Tumorile stromei cordonului sexual

Tumorile cu celule Leydig

•Tumorile din celulele Leydig prezintă un interes deosebit deoarece pot produce androgeni și, în unele cazuri, androgeni și estrogeni și chiar corticosteroizi. Tumorile din celulele Leydig pot apărea la orice vârstă, dar sunt mai des observate la vârsta de 20-60 de ani, la unii pacienți ginecomastia poate fi prima manifestare. La copii, simptomele dominante se bazează pe efecte hormonale, manifestându-se în principal sub formă de pubertate prematură.



Tumori testiculare

Tumorile stromei cordonului sexual

Tumorile cu celule Leydig

•**Morfologie.** Tumorile cu celule Leydig sunt noduli rotunjiți, de obicei cu diametrul mai mic de 5 cm. Pe secțiune are o culoare caracteristică maro-aurie.

Aproximativ 10% din tumori la adulți se caracterizează prin creștere invazivă și metastazare;



Tumori testiculare

Tumorile stromei cordonului sexual

Tumori cu celule Sertoli

- Majoritatea tumorilor din celulele Sertoli sunt inactive hormonal și benigne, doar 10% din aceste tumori se malignizează.
- Morfologie.** Aceste tumori prezintă noduli mici, denși, cu o suprafață uniformă pe secțiune au aspect alb-cenușiu sau galben. Celulele tumorale sunt grupate în trabecule, care tind să formeze structuri sub formă de cordoane și tuburi.




Prostata

- La un bărbat adult, sănătos, masa prostatei este de 20 g.

În prostată a unui bărbat adult. Există mai multe zone:

- centrală,
- periferică,
- de tranziție,
- fibromusculară
- periuretrală.

Tumora malignă este localizată în principal în zona periferică și poate fi detectată prin examen digital rectal. Dimpotrivă, hiperplazia nodulară este localizată mai aproape de zona centrală și mai des decât o tumoră malignă, determină obstrucția tractului urinar.



Prostata

Hiperplazie benignă de prostată

• *Hiperplazia benignă de prostată (HBP)*, sau hiperplazia nodulară, este o patologie foarte frecventă la bărbații peste 50 de ani. Se caracterizează prin proliferarea celulelor stromale și epiteliale ale prostatei cu formare de noduli mari, discreți în zona periuretrală.

Nodulii, mărindu-se în dimensiuni comprimă uretra, ceea ce provoacă obstrucția parțială sau totală a uretrei.



Prostata

Hiperplazie benignă de prostată

•**Frecvența.** ~ 20% dintre bărbați au semne histologice de HBP la 40 de ani, ~ 70% la 60 de ani și aproape toți bărbații (~ 90%) au semne histologice de HBP. Doar 50% dintre bărbații cu BPH confirmată histologic au o mărire pronunțată clinic și doar 50% dintre ei au simptome clinice. HBP este o problemă majoră.



Prostata

Hiperplazie benignă de prostată


•**Etiologie și patogeneză.** Deși în zona periuretrală a prostatei sunt un număr crescut de celule epiteliale și stromale, nu există dovezi clare ale activității proliferative crescute a celulelor epiteliale în HBP. Dimpotrivă, se crede că veriga principală a procesului hiperplastic este o încălcare a apoptozei. Se crede că o scădere a ritmului normal de apoptoză duce la acumularea de celule îmbătrânite în prostată. Androgenii joacă un rol în dezvoltarea BPH, care poate nu numai să potențeze proliferarea celulelor, ci și să inhibe apoptoza.



Prostata

Hiperplazie benignă de prostată

- Principalul androgen al prostatei este dihidrotestosteronul (DHT). Se formează în prostată prin transformarea testosteronului prin intermediul enzimei 5 α -reductază. Această enzimă este localizată aproape în totalmente în celulele stromale. Celulele epiteliale ale prostatei nu conțin 5 α -reductază, cu excepția unui număr mic de celule din stratul bazal. Astfel, de creșterea prostatei prin intermediul androgenilor sunt responsabile celulele stromale.



TUMORI

Adenocarcinomul

Etiologie și patogeneză. Androgenii joacă un rol important în dezvoltarea carcinomului de prostată. Creșterea și dezvoltarea celulelor tumorale, precum și celulele normale ale prostatei, depind de androgeni, care, atunci când sunt legați de receptorul de androgeni, induc expresia genelor responsabile de creșterea celulelor și de supraviețuirea lor.

Importanța androgenilor în susținerea creșterii și supraviețuirii celulelor tumorale în prostată poate fi demonstrată prin efectului castrării sau terapiei antiandrogenice, care de obicei duce la o regresie a bolii.



TUMORI

Adenocarcinomul

În 70% din cazuri, carcinomul de prostată este localizat în zona sa periferică (de obicei în partea posterioară a glandei, ceea ce permite palparea tumorii în timpul examinării digitale rectale).

Adenocarcinomul prostatic. Țesutul tumoral este localizat în partea posterioară a glandei (stânga jos). Țesutul alb dens al tumorii diferă de structura friabilă a zonei periferice benigne din partea opusă.



TUMORI

Adenocarcinomul

Metastazele se răspândesc inițial prin vasele limfatice până la nivelul nodulilor limfatici regionali și ajung la nodulii limfatici paraaortali.

Diseminarea hematogenă are loc mai ales în oase, în special în oasele scheletului axial, dar în unele cazuri există o diseminare masivă către organele interne (mai degrabă o excepție decât o regulă). Metastazele osoase sunt de obicei osteoblastice și, dacă sunt depistate la bărbați, indică clar prezența carcinomului de prostată. Cel mai des este afectată coloana lombară, apoi (în ordinea descrescătoare a frecvenței) - partea proximală a femurului, osul pelvin, coloana toracică și coastele.



Vulva.

Vulva este organul genital feminin extern și cuprinde tegumentul cu pilozitate și mucoasa acestei regiuni. Cel mai frecvent, afecțiunile vulvei sunt inflamatorii, fiind mai curând neplăcute decât severe. Tumorile maligne ale vulvei, deși au risc vital, sunt rare.

Vulvita

Una dintre cele mai frecvente cauze de vulvită este inflamația reactivă ca răspuns la un stimul exogen, care poate fi un agent iritant(dermatită iritativă de contact) sau de natură alergică(dermatită alergică de contact).

- Dermatita exzematooasă iritativă de contact se manifestă prin papule și plăci eritematoase bine delimitate, care formează vezicule și cruste și poate fi o reacție la urină, săpun, detergenți, antiseptice, deodorante sau alcool. Dermatita alergică are un aspect clinic similar și poate fi provocată de alergia la parfumuri; de aditivi din creme, loțiuni de săpunuri; de tratamente chimice aplicate pe îmbrăcăminte; precum și de alți antigeni.

- Valvulitele pot fi cauzate și de infecții, care în acest caz sunt frecvent transmise pe cale sexuală. Agenții infecțioși întâlniți mai frecvent sunt virusul papilloma uman(HPV), care determină apariția condiloamelor acuminate și a neoplaziei intraepiteliale vulvare.

- Virusul herpes simplex (VHS-1 și VHS-2), care provoacă herpesul genital, cu erupție veziculară caracteristică
- N.gonorrhoeae, care produce infecție supurativă a glandelor vulvo-vaginale.
- T.pallidum, agentul etiologic al sifilisului, care produce șancrul primar la locul de inoculare, pe aria valvulară, și Candida, o altă cauză potențială de valvulită.

- O complicație importantă a valvulitei este obstrucția ductelor excretorii ale glandelor Bartolin. Obstrucția poate conduce la dilatarea dureroasă a glandelor (chist Bartolin) cu formare de abces.

Vulvită acută



Фото острого вульвита у женщины

Vulvită fungică



Фотография кандидозного вульвита

Vulvită cronică cu atrofie



Фото хронического вульвита у женщин

Afecțiunile epiteliale non-neoplazice

- Epiteliul mucoasei valvulare poate suferi două tipuri de modificări:
 - 1) Subțiere atrofică, urmată de apariția lichenului scleros.
 - 2) Îngroșare hiperplazică, manifestată sub formă de lichen simplu cronic.

Lichenul scleros(leucoplazie)

- Lichenul scleros se caracterizează prin subțierea și atrofia epidermului, ștergerea reliefului papilar, degenerarea hidropică a celulelor bazale, fibroza dermului, și apariția unui infiltrat inflamator redus, perivascular, alcătuit din celule mononucleare.

- Se prezintă sub forma unor plăci netede albe (denumite leucoplazie) sau a unor papule, care în timp se pot extinde și fuziona. Când este afectată vulva în întregime, labiile devin oarecum atrofice și indurate, iar orificiul vaginal este îngustat.

- Lichenul scleros apare la toate grupele de vârstă, dar cel mai frecvent sunt afectate femeile după menopauză. Patogeneza este incomplet cunoscută, dar prezința limfocitelor T activate în infiltratul inflamator subepitelial și frecvența crescută a bolilor autoimune la femeile afectate sugerează o etiologie autoimună.

- Lichenul scleros este o afecțiune benignă; cu toate acestea, un mic procent din femeile care prezintă lichen scleros simptomatic(1-5%) dezvoltă carcinom valvular scuamocelular.

Lichenul scleros(leucoplazia)



Lichenul simplu cronic

- Lichenul simplu cronic este caracterizat prin îngroșarea epiteliului, în special a stratului granulos și hipercheratoza. La nivelul straturilor bazal și suprabazal se observă o creștere a activității mitotice; cu toate acestea, nu există atipii epiteliale.

- Uneori, infiltratul leucocitar dermic este destul de pronunțat. Aceste modificări nespecifice sunt consecința iritației cronice, cauzată frecvent de pruritul asociat unei dermatoze inflamatorii subiacente. Lichenul simplu cronic apare sub forma unei zone de leucoplazie.

- Leziunile izolate nu prezintă risc crescut pentru cancer, dar lichenul simplu cronic este prezent frecvent la periferia unui cancer valvular diagnosticat, ceea ce ridică ipoteza unei asocieri cu boala neoplazică.

- Lichenul scleros și lichenul simplu cronic pot coexista în diferite zone ale corpului la unele persoane, și ambele leziuni se pot prezenta sub formă de leucoplazie. Macule de plăci similare sunt întâlnite frecvent și în alte tipuri de dermatoze benigne, cum ar fi psoriasisul sau lichenul plan, precum și în leziunile maligne ale vulvei, cum ar fi carcinomul scuamocelular in situ sau carcinomul scuamocelular invaziv. De aceea, pentru a diferenția aceste leziuni cu aspect clinic similar sunt necesare biopsia și examinarea microscopică.

Condiloame.

- Denumirea de condilom este dată oricărei leziuni valvulare cu aspect de neg. Majoritatea leziunilor de acest tip pot fi incluse în una din cele două categorii distincte:
- 1. Condilomul *plan* (*Condylomata lata*), rar întâlnit la ora actuală, este o leziune plană, umedă și ușor reliefată care apare în sifilisul secundar.
- 2. Condilomul acuminat (*Condylomata acuminata*), mult mai frecvent, poate fi papilar și reliefat sau mai aplatizat și rugos.

- Condiloamele pot apărea oriunde pe suprafața ano-genitală, uneori sub forma unei singure leziuni dar mai frecvent ca leziuni multiple. Atunci când sunt localizate la nivelul vulvei, au diametru cuprins între câțiva milimetri și mai mulți centimetri și au culoare de la roșu-roz la roz-brun.

Condilomul *plan*(*Condylomata lata*)



Condilomul acuminat(*Condylomata acuminata*)



- La examenul histologic, leziunea celulară caracteristică este coilocitoza, o modificare citopatică reprezentată de vacuolinizarea perinucleară a citoplasmei și aspectul încrețit al membranei nucleare, specifică infecției HPV. Infecția cu tipurile 6 și 11 de HPV prezintă risc redus de transformare malignă, iar condiloamele vulvare nu evoluează de obicei spre cancer.

Carcinomul vulvar

- Carcinomul vulvar reprezintă aproximativ 3% din totalul cancerelor genitale feminine, și apare mai frecvent la femeile cu vârstă peste 60 de ani. Aproximativ 90% din carcinoame sunt scuamocelulare; celelalte tumori sunt în principal adenocarcinoame sau carcinoame bazocelulare.

- Există două forme diferite de carcinom scuamocelular vulvar. Forma mai rară este cauzată de tulpinile HPV cu risc înalt (în special subtipurile 16 și 18) și apare la femeile de vârstă medie, în special la fumătoare. În această formă, debutul carcinomului este precedat frecvent de modificări precanceroase epiteliale, denumite neoplazie vulvară intraepitelială.

- A doua formă de carcinom vulvar apare la femeile în vârstă. Nu se asociază cu HPV, dar este precedat deseori de mai mulți ani în care au loc modificări epiteliale reactive, în principal de lichen scleros. Epiteliul superficial nu prezintă de obicei modificări citologice specifice pentru neoplazie vulvară intraepitelială, dar pot fi prezente atipii minore ale stratului bazal și cheratinizare bazală. Tumorile invazive de acest tip au tendința de a fi bine diferențiate și intens cheratinizate.

- Neoplaziile vulvare intraepiteliale sunt carcinoame vulvare incipiente, care se manifestă prin zone de leucoplazie sub forma unor macule albicioase de epiteliu îngroșat. În aproximativ un sfert din cazuri leziunile sunt pigmentate datorită prezenței melaninei. Cu timpul, aceste zone se transformă fie în tumori exofitice, fie în tumori endofitice ulcerative. Tumorile HPV pozitive sunt multifocale și verucoase, și în timp ce tumorile HPV negative sunt de regulă carcinoame scuamocelulare chernatinizate, bine diferențiate, unifocale.

Vaginul.

- **Vaginita** – este o afecțiune relativ frecventă, de obicei tranzitorie și fără consecințe clinice. Se asociază cu apariția unei secreții vaginale abundente (leucoree). Este cauzată de diverse microorganisme: bacterii, fungi și paraziți. Multe dintre acestea sunt comensuale (aparțin florei normale vaginale) și devin patogene numai atunci când există anumite condiții predispozante, precum diabetul zaharat, antibioterapia sistemică (care produce distrugerea florei microbiene normale), imunodeficiența, sarcina sau avortul recent.

- **Carcinomul scuamocelular vaginal** este foarte rar întâlnit și de obicei apare la femeile cu vârsta peste 60 de ani în prezența unor factori de risc similari carcinomului de col uterin. Neoplazia intraepitelială vaginală este o leziune precursoră care se asociază aproape întotdeauna cu infecția HPV.

- **Afecțiunile dishormonale.**

- Hiperplazia endometriului- se caracterizează prin proliferarea glandelor și stromei endometriului în legătură cu tulburările neurohormonale a ciclului menstrual.
- Mecanismul patogenetic principal este hiperestrogenismul. Se observă în insuficiența funcțională a ovarelor, îndeosebi în perioada climacterică. La femeile de vîrstă fertilă se întâlnește mai frecvent în polichistoză ovariană, precum și în obezitate.

- Se observă mai frecvent după vîrsta de 40 de ani.
- Se deosebesc 2 variante de hiperplazie a endometriului


1)Simplă glandulară sau glandulo-chistică

2)Atipică



- **Morfologia**

- Are loc îngroșarea considerabilă a endometriului datorită proliferării stratului funcțional. Semnele microscopice- epiteliul devine cilindric, numărul de mitoze crește, stroma este edemațiată, succulentă, în stare de proliferare. Glandele se măresc în dimensiuni, devin alungite, cu aspect șerpuitor și dilatări chistice. Se observă hemoragii din vasele superficiale ale mucoasei uterine cu modificări distrofice, tromboza vaselor și focare de necroză.

- Mucoasa umple toată cavitatea uterină, suprafețele anterioară și posterioară ale cavității uterine se comprimă reciproc, ceea ce cauzează tulburări circulatorii, necroze, detașarea mucoasei și hemoragii abundente.
- Hemoragiile aciclice sunt stimulate de tulburările circulatorii, care apar sub acțiunea estrogenilor asupra endometriului.



**Hiperplazie glandulo-
chistică a endometrului**



- Hiperplazia atipică/adenomatoza focală/ se caracterizează prin proliferarea intensivă a epiteliului și/sau a glandelor endometriale.
- Este o stare precanceroasă. Mai frecvent se întâlnește după 50 ani. Clinic hemoragii anovulatorii.
- **Morfologic** – stroma este bogată în elementele celulare, se observă celule mari cu citoplasma clară, spumoasă, care conțin lipide, pot fi focare de metaplazie pavimentoase. În cazurile de hiperplazie atipică a endometriului la femei în perioada de menopauză se efectuează histerectomia.

- Majoritatea leziunelor colului uterin sunt reprezentate de inflamații relativ banale (cervicita), dar colul uterin constituie și localizarea unuia din cele mai răspândite cancere la femeile de pe tot globul.
- leziunile inflamatorii ale colului uterin sunt foarte frecvente și se asociază cu secreție vaginală purulentă. Cervicitele pot fi clasificate în infecțioase și neinfecțioase, deși diferențierea lor este dificilă din cauza prezenței florei vaginale normale care cuprinde aerobi și anaerobi vaginali ocazionali, streptococi, stafilococi, enterococi și *Escherichia coli*.

- **Cervicita nespecifică** poate fi **acută** sau **cronică**. Forma acută, relativ rară, este întâlnită predominant la femeile aflate în perioada post-partum, și este cauzată de obicei de stafilococi și streptococi. Cervicita cronică se caracterizează prin inflamație și regenerare epitelială care apare frecvent, în diverse grade, la femeile de vârstă fertilă. Epiteliul cervical poate prezenta hiperplazie și modificări reactive atât ale mucoasei scuamoase cât și a celei cilindrice. Uneori, epiteliul cilindric suferă metaplazie scuamoasă.

Endocervicoza

- Este cea mai frecventă patologie a colului uterin. Macroscopic în jurul orificiului extern al colului uterin se observă o zonă de culoare roșietică datorită vascularizării bogate a stratului subepitelial. Histologic are loc apariția unor focare de epiteliu prismatic pe suprafața porțiunii vaginale a colului uterin și a structurilor glandulare, acoperite cu epiteliu de tip endocervical.

- Cauza nu este cunoscută, se presupune rolul tulburărilor dishormonale.
- Variantele morfologice/stadiile/-
 - 1. Simplă/staționară/
 - 2. Proliferantă/progresantă/
 - 3. Cu epidermizare

- **Complicațiile**

- Erodarea mucoasei cervicale în regiunea orificiului extern
- Inflamația mucoasei/cervicită/
- Displazia epiteliului
- Dezvoltarea cancerului



Polipii colului uterin

- Se observă mai frecvent în canalul cervical. Sunt cauzați de dereglările dishormonale.
- Variantele morfologice
 - 1. Polip simplu
 - 2. Polip proliferant
 - 3. Polip cu epidermizare
- Morfologic are loc distribuirea neomogenă a glandelor de formă și dimensiuni diferite, iar în baza polipului se observă un ghem de vase cu pereții îngroșați și sclerozați.

Polipii cavității uterine

Variantele :

- Glandular
- Glandulo-fibros
- Fibros
- Adenomiomatos/conține celule musculare netede/





Polip endometrial

- Noțiunea de adenomioză se referă la creșterea stratului bazal al endometriului în miometriu. Profund în miometriu se găsesc cuiburi de stromă, glande sau ambele componente ale endometriului interpuse între fibrele musculare.
- Apariția glandelor endometriale cu stroma citogenă adiacentă în miometriu, se localizează de regulă în zonele submucoase ale miometriului.

- Prezența aberantă a țesutului endometrial induce hipertrofia reactivă a miometriului, și în timp uterul devine voluminos, globular, cu peretele frecvent îngroșat. Deoarece în adenomioză glandele au originea în stratul bazal al endometriului, ele nu vor suferi sângerare ciclică. Cu toate acestea, adenomioza marcată poate provoca menoragie, dismenoree pelviană înainte de menstruație.

- În miometriu pe secțiune se observă cavități chistice de formă și dimensiuni diferite, de obicei, umplute cu sânge. Clinic se manifestă prin menstruații abundente, dureroase, uneori sterilitate. Malignizarea este rară.




Adenomioza peretelui uterin

- Endometrioza este difinită prin prezența glandelor și a stromei endometriale în afara endometriului. Apare la aproximativ 10% din femeile aflate în vârstă fertilă și la aproape jumătate din femeile cu infertelitate.

- Spre deosebire de adenomioză, endometrioza conține aproape întotdeauna endometriu funcțional, care suferă sângerare ciclică. Deoarece sângele se acumulează în aceste focare aberante, ele se prezintă macroscopic ca niște noduli sau implanturi de culoare roșu-brun.

- Au mărime care variază de la dimensiuni microscopice până la un diametru de 1-2 cm și sunt localizate pe seroase sau imediat subseros. Frecvent, leziunile individuale se unesc formând mase de dimensiuni mai mari, pline cu sânge care cu timpul devin maronii (CHISTURI CIOCOLATII).



Chist ovarian endometrioid
(ciocolatiu)

- Prin acumularea și organizarea sângelui se produce fibroza extinsă, cu formarea de aderențe între structurile pelviene, obturarea fimbriilor trompelor uterine și distorsiuni ale trompelor uterine și ale ovarelor.
- Diagnosticul histologic se face prin punerea în evidență a două din următoarele trei componente ale leziunii: glande endometriale, stroma endometrială și pigmentul hemosiderină.

Afecțiunile inflamatorii

- **Endometrita** – inflamația mucoasei uterine. Poate fi acută și cronică. Endometrita acută se întâlnește de obicei în perioada postpartum sau postabortum. Etiologia este infecțioasă, mai frecvent stafilo- sau streptococul, colibacilul, infecția anaerobă.

Formele morfologice:

- Catarală
- Fibrinoasă
- Hemoragică
- Purulentă
- Endometrita cronică se caracterizează prin atrofia sau hipertrofia endometriului.

Carcinomul de col uterin

Stările de precancer:

- Displazia colului uterin
- Leucoplazia cu semne de atipie
- Eritroplazia – hiperplazia epiteliului pavimentos pluristratificat cu atipia celulelor
- Adenomatoza
- Infecția papilomavirică

Formele microscopice ale cancerului de col uterin:

- Cancer pavimentos – forma cea mai frecventă
- Adenocarcinom – mai rar, 4-5%
- Mixt glandular-pavimentos/adeno-scuamos/
- Macroscopic cancerul de col uterin crește exofit în porțiunea vaginală a colului uterin și endofit – în canalul cervical.

Cancer de corp uterin

Se localizează mai frecvent în regiunea unghiurilor și fundului uterului, de obicei, în perioada postmenopauzală.

- Macroscopic se manifestă prin proliferări polipoase sau papilare de diferite dimensiuni.
- Histologic se observă mai frecvent adenocarcinomul moderat diferențiat.

Leiomiomul uterin(fibroleiomiom) – este cea mai frecventă tumoare a uterului, mai frecventă la femei în vîrstă după 35 ani.

Variantele :

- Subseros
- Intramural
- Submucos

Tumorile ovarului

- Tumorile ovariene epiteliale constituie mai mult de jumătate din tumorile ovariene primare, iar cele maligne – în medie 20-25% din tumorile organelor genitale feminine.

Variantele:

- 1. Tumorile epiteliale benigne – chistadenom seros și chistadenom mucinos.
- 2. Tumorile epiteliale maligne – chistadenocarcinom seros și cistadenocarcinom mucinos.
- Tumorile ovariene maligne pot infiltra organele vecine.