



**Необратимые тканевые /  
клеточные повреждения: некроз,  
апоптоз.**

## Тема: Необратимые тканевые / клеточные повреждения: некроз, апоптоз.

### I. Микропрепараты:


#### № 6. Ишемический инфаркт селезенки. (окраска Г-Э).

##### Обозначения:

1. Безядерная зона некроза (кариолиз).
2. Демаркационная зона:
  - а. гиперемизированные сосуды;
  - б. лейкоцитарный инфильтрат.
3. Прилегающая ткань селезенки.

В препарате имеется гомогенная, бесструктурная зона, окрашенная эозином (детрит), клетки фрагментированы, разрушены (циторексис и цитолизис), ядра отсутствуют (кариолизис); на периферии этой зоны могут быть обломки распавшихся ядер (кариорексис); из первичных структур в зоне инфаркта сохранены лишь слабо окрашенные соединительнотканые трабекулы; на периферии инфаркта отмечается зона отека, полнокровия кровеносных сосудов и инфильтрации нейтрофильными лейкоцитами – демаркационное воспаление, которое отграничивает зону некроза; прилегающая ткань селезенки гиперемизирована.

*Инфаркт селезенки является белым, ишемическим инфарктом, что обусловлено недостаточностью коллатерального кровообращения; наиболее частые причины – это тромбоз или эмболия одной из ветвей селезеночной артерии. Встречается при атеросклерозе селезеночной артерии, осложненном тромбозом, при атеросклерозе аорты – эмболия тромбами или атероматозными массами, при тромбозе в левом желудочке, который может осложниться тромбоэмболией, напр., при ревматическом или инфекционном эндокардите, инфаркте миокарда, кардиомиопатиях и др.; самый частый исход инфаркта селезенки – организация (рубцевание), капсула в области инфаркта становится толстой, склерозированной.*



№ 6. Ишемический инфаркт селезенки. (окраска Г-Э).


## № 81. Казеозный некроз лимфоузла при туберкулезе. (окраска Г-Э).

### Обозначения:

1. Очаг казеозного некроза .
2. Воспалительный инфильтрат (лимфоциты, эпителиоидные клетки, гигантские клетки)

В препарате невооруженным глазом видна обширная зона розово-красного цвета, при малом увеличении эта зона однородная, мелкозернистая, бесструктурная, интенсивно окрашенная эозином, ядра отсутствуют (кариолизис), на периферии очага некроза могут быть фрагменты ядер (кариорексис); в окружающей ткани встречаются туберкулезные гранулемы в стадии фиброза, а в некоторых из них гигантские многоядерные клетки Лангганса.

*Казеозный некроз встречается чаще всего при туберкулезе, но также и при сифилисе, лимфоме Ходжкина, лепре, при некоторых микотических гранулемах. Является вариантом сухого, коагуляционного некроза. Некротические массы имеют плотную консистенцию, бело-желтого цвета, рассыпчатые, напоминают сухую творожистую массу. Гистологически зона некроза имеет аморфный, бесструктурный вид, окрашена эозином. Характерна полная потеря архитектоники тканей, клеточные и тканевые структуры полностью исчезают. Наиболее частые исходы – кальцификация (петрификация), инкапсуляция и организация.*



№ 81. Казеозный некроз лимфоузла при туберкулезе. (окраска Г-Э).


## № 153. Панкреонекроз. (окраска Г-Э).

### Обозначения:

1. Очаг некроза железистой ткани.
2. Очаг некроза жировой ткани.
3. Прилегающая ткань поджелудочной железы.

В препарате отмечаются интенсивно окрашенные очаги некроза паренхимы поджелудочной железы, в которых структура стерта, структурные элементы разрушены, некротические массы инфильтрированы нейтрофильными лейкоцитами, встречаются фрагменты ядер (кариорексис); в очагах некроза интрапанкреатической жировой ткани некротизированные адипоциты набухшие, плохо очерчены, цитоплазма окрашена базофильно; окружающая железистая ткань отечна, гиперемирована.

*Стеатонекроз (жировой некроз) – некроз жировой ткани. Это форма энзиматического некроза, обусловленного действием липазы и трипсина, которые выделяются ацинарными клетками в случаях острого панкреатита (панкреонекроза). Липаза проникает в адипоциты, вызывает их некроз и трансформацию жиров в мыла (соли жирных кислот), которые макроскопически имеют вид стеариновых пятен бело-желтого цвета, плотной консистенции, хорошо очерченных. При острых панкреатитах очаги стеатонекроза выявляются в поджелудочной железе, сальнике, брыжейке и в жировой ткани из других отделов. Микроскопически адипоциты становятся нечеткими, со стертыми контурами, окрашены базофильно (в синий цвет) из-за повышенного содержания солей кальция. Встречается также при травмах жировой ткани, напр., молочной железы.*



№ 153. Панкреонекроз. (окраска Г-Э).


## **№ 2. Некроз эпителия извитых канальцев почки. (окраска Г-Э).**

### **Обозначения:**

1. Некроз эпителия извитых канальцев:
  - а. безядерные эпителиальные клетки (*кариолиз*);
  - б. стеноз просвета.
2. Неизмененные канальцы.
3. Неизмененный клубочек.

Эпителиальные клетки проксимальных и дистальных извитых почечных канальцев набухшие, не содержат ядер (*кариолизис*), цитоплазма однородная, розового цвета (*эозинофильная*); просвет канальцев сужен, а в некоторых полностью обтурирован массами клеточного детрита (*плазморексис* и *плазмолизис*); кровеносные сосуды расширены, полнокровны, клеточная структура клубочков, петель Генле, прямых и собирательных канальцев сохранена.

*Некротический нефроз (некротический нефроз) развивается вследствие нарушений кровообращения (кортикальная ишемия почек) или прямого токсического действия на нефроциты различных химических веществ (хлорид ртути, этиленгликоль и др.). Клинически проявляется острой почечной недостаточностью (олигурия или анурия). Встречается при шоковых состояниях (травматический, кардиогенный, токсический, бактериальный, посттрансфузионный и др.). Возможные исходы некротического нефроза – регенерация почечных канальцев и полное выздоровление с восстановлением диуреза или смерть от уремии.*



№ 2. Некроз эпителия извитых канальцев почки. (окраска Г-Э).

## ***II. Макропрепараты:***

### **№ 141. Ишемический инфаркт селезенки.**

На поверхности разреза селезенки видны участки некроза треугольной (конической) формы, бело-желтого цвета, плотной консистенции, хорошо отграниченные от окружающей ткани, основанием обращенные к капсуле и верхушкой к воротам (это связано с веерообразным ветвлением селезеночной артерии); капсула покрыта наложениями фибрина (фибринозное воспаление), что клинически проявляется чувством боли в левом подреберье [*микроскопическая картина – микропрепарат № 6*].

### **№ 151. Сухая гангрена кисти (стопы).**

Мягкие ткани стопы (кисти) сухие, сморщены, мумифицированы, черного цвета, плотной консистенции; на границе между зоной гангрены и жизнеспособной тканью имеется демаркационная линия (демаркационное воспаление).

*Гангрена развивается в тканях (органах), которые имеют контакт с внешней средой. Черная окраска обусловлена сульфидом железа, который образуется при контакте гемоглобиногенных пигментов с атмосферным воздухом и сероводородом, выделяемым бактериями в мертвых тканях. В результате демаркационного воспаления может произойти постепенное расплавление мертвых тканей и полное их отделение – аутоампутация. Наиболее частые причины гангрены конечностей, в первую очередь, нижних, являются атеросклероз, сахарный диабет, облитерирующий эндартериит, а также травмы, ожоги, отморожения. В случае присоединения бактериальной инфекции сухая гангрена может перейти во влажную в связи с расплавлением мертвых тканей под влиянием протеолитических ферментов бактерий и лейкоцитов.*



№ 141. Ишемический инфаркт селезенки.



№ 151. Сухая гангрена кисти (*стопы*).

### **№ 131. Панкреонекроз (острый некротический панкреатит).**

В поджелудочной железе имеются очаги кровоизлияний темно-красного цвета и очаги некроза жировой ткани бело-желтого цвета, расположенные как в толще самой железы, так и в окружающей ткани, напоминающие стеарин (очаги стеатонекроза).

*Панкреонекроз или острый некротический панкреатит является острой патологией из области ургентной медицины («острый живот»), при котором происходит энзиматическое разрушение ткани поджелудочной железы и жировой ткани (стеатонекроз) под действием гиперактивированных поджелудочных ферментов, в первую очередь, трипсина и липазы (самопереваривание). Самые частые причины - это болезни желчных путей и алкоголизм. Самое тяжелое осложнение – энзиматический шок, который может привести к летальному исходу.*

### **№ 43. Казеозный некроз при туберкулезе (казеозная пневмония).**

В легком имеется обширная безвоздушная зона, бело-желтого цвета, напоминающая сухую, рассыпчатую творожистую массу, откуда и название «казеозная» пневмония (лат. caseum -творог).

*Казеозный некроз характерен для туберкулеза. Казеозная пневмония наблюдается чаще при вторичном туберкулезе, но может быть и при первичном. На плевре имеются наложения фибрина. Казеозные массы могут подвергаться расплавлению с образованием полостей распада – каверн (кавернозный туберкулез).*



№ 131. Панкреонекроз (острый некротический панкреатит).



№ 43. Казеозный некроз при туберкулезе (казеозная пневмония).


### № 13. Постинфарктный крупноочаговый кардиосклероз.

На разрезе стенки левого желудочка отмечается зона рубцовой волокнистой соединительной ткани серовато-белого цвета, плотной консистенции, напоминает хрящ, стенка желудочка утолщена, гипертрофирована.


*Крупноочаговый кардиосклероз является исходом инфаркта миокарда, образуется в результате организации зоны инфаркта, которая происходит в течении 6-7 недель после начала болезни. В зоне постинфарктного рубца могут откладываться соли кальция, в прилежащей ткани миокарда отмечается компенсаторная гипертрофия. Возможные осложнения: застойная сердечная недостаточность, нарушения ритма и проводимости, хроническая аневризма сердца.*




№ 13. Постинфарктный крупноочаговый кардиосклероз.




Кариопикноз и кариорексис лимфоидной ткани.




Ценкеровский (восковидный) поперечно-полосатой скелетной мускулатуры. (окраска Г-Э)



**Когуляционный некроз миокарда.**



**Исход коагуляционного некроза миокарда.**



Ишемическая размягчение мозга


Multiple, old, cerebral infarcts  
in a 34 year old patient with  
healed bacterial endocarditis of  
the mitral valve.




## Исход инфаркта головного мозга



Казеозный некроз  
лимфатического узла при  
туберкулезе.



**Казеозный некроз  
лимфатического узла при  
туберкулезе.  
(Окраска Г-Э).**





Казеозный некроз легких.



**Влажная гангрена стопы.**




**Пролежни (лат. decubitus)**





Костный  
секвестр





**Гангрена тонкого кишечника.**



NORMAL



NECROSIS



APOPTOSIS

Enzymatic digestion and leakage of cellular contents

Apoptotic body

Phagocyte

Phagocytosis of apoptotic cells and fragments

- **Апоптоз и некроз** являются двумя наиболее распространёнными видами гибели клеток в живом организме, хотя они не исчерпывают её другие возможные варианты. Некроз можно назвать «убийством» клеток в живом организме, поскольку он является конечным выражением их необратимого повреждения, вызванного действием различных повреждающих факторов.

- В противоположность этому апоптоз наступает и в живом организме, но в результате включения генетической программы смерти клетки, без предварительного развития её летальных повреждений и, образно говоря, является «самоубийством» клетки.

- Некроз и апоптоз являются разновидностями смерти клетки в живом организме. Отличия апоптоза от некроза связаны с различиями в их распространённости, генетическими, биохимическими, морфологическими и клиническими проявлениями. Существенным отличием апоптоза от некроза является то, что апоптоз распространяется только на отдельные клетки или их группы, в то время как некроз может захватывать территорию, начиная от части клетки до целого органа

- **Некроз** (от греч. necros – мёртвый ) – омертвление, гибель клеток и тканей в живом организме в ответ на повреждение, механизм которого связаны с денатурацией белка и активацией гидролитических ферментов, ведущей к посмертному расплавлению тканей – *аутолизу*.
- **Некроз** – это общепатологический процесс, он происходит только в условиях патологии. Понятие «некроз» является видовым по отношению к более общему понятию «смерть»

- Некроз может захватывать участки тела, целые органы, ткани, групп клеток и отдельные клетки. Существует также понятие о *фокальном некрозе*, когда речь идёт о гибели части клетки или группы её внутриклеточных структур. Некроз развивается, как правило, при действии повреждающего фактора. Он может иметь самостоятельное значение, а также завершать или быть важнейшим звеном в таких патологических процессах, как дистрофии, воспаление, расстройства кровообращения, опухолевый рост и др.

# Этиология и патогенез некроза

Некроз могут вызывать следующие причины:

- Кислородная недостаточность
- Химические факторы
- Инфекционные агенты
- Иммунологические реакции
- Генетические дефекты
- Физические агенты

Вместе с тем выделяют 5 основных этиологических факторов некроза:

- Травматический;
- Токсический;
- Трофоневротический;
- Аллергический;
- Сосудистый.

Этиологический принцип положен и в основу классификации видов некроза.

По механизму действия этиологического фактора некроз может быть *прямым и непрямым.*

- **Прямой некроз** возникает при непосредственном действии повреждающего фактора на клетки и ткани и может быть :
- *Травматическим*, возникающем в результате прямого действия на ткань физических (механических, температурных, вибрационных, радиационных и др.), химических (кислот, щелочей и др.) факторов;
- *Токсическим*, который развивается при действии на ткани токсических факторов бактериальной и другой природы.

**Непрямой некроз** возникает в результате нарушений функций различных систем, следствием чего является омертвление тканей в области этих нарушений. Он может быть сосудистым, трофоневротическим и аллергическим.

- *Сосудистый некроз* связан с абсолютной или относительной недостаточностью циркуляции крови в кровеносных или лимфатических сосудах из-за нарушения кровообращения в них результате обтурации просвета тромбом или длительного спазма, а также при функциональном перенапряжении органа в условиях гипоксии.

- *Трофоневротический некроз* развивается при нарушении иннервации тканей и циркуляции в них крови при заболеваниях центральной и периферической нервной системы, что приводит к развитию пролежней.
- *Аллергический некроз* является результатом иммунного цитолиза тканей реакцией гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) и замедленного типа (ГЗТ)

# Морфогенез некроза

- Некротический процесс проходит ряд морфогенетических стадий: паранекроз, некробиоз, смерть клетки, аутолиз.
- *Паранекроз* – изменения, подобные некротическим, но обратимые.
- *Некробиоз* – необратимые дистрофические изменения, характеризующиеся преобладанием катаболических реакций над анаболическими.

- *Аутолиз* – разложение мёртвого субстрата под действием гидролитических ферментов погибших клеток и клеток воспалительного инфильтрата.

# Патологическая анатомия

- Ранние стадии обычно не видны невооружённым взглядом и при световой микроскопии. Его поздние стадии имеют разнообразные микроскопические проявления, но общим являются изменения цвет, консистенции и в ряде случаев запаха некротических тканей.

- В одних случаях мёртвая ткань дряблая, содержит большое количество жидкости, подвергается миомалации ( от греч. malakas – мягкий ). Такой некроз называется *колликвационным*. В других случаях некротизированная ткань может иметь плотную и сухую консистенцию, что характеризует *коагуляционный некроз*. Ткань при этом может подвергнуться мумификации.

- Цвет некротических масс зависит от наличия примесей крови и различных пигментов, а также он обусловлен развитием на границе между мёртвой и живой тканью зоны демаркационного воспаления, имеющей красно-бурый цвет. Мёртвая ткань бывает белой или желтоватой, нередко окружённой красно-бурым венчиком.

- При пропитывании некротических масс кровью они могут приобретать окраску от красной до бурой, желтой и зелёной в зависимости от преобладания в них тех или иных гемоглобиногенных пигментов.
- В некоторых случаях очаги некроза прокрашиваются желчью. При гнилостном расплавлении мёртвая ткань издаёт характерный дурной запах.

- Некроз в результате снижения и/или прекращения кровотока называется *инфарктом*.

По цвету инфаркт может быть:

- *Белым* ( в селезёнке, головном мозге );
- *Белым с геморрагическим венчиком* (в сердце, почках). Геморрагический венчик формируется за счёт демаркационного воспаления, которая закономерно возникает на границе мёртвых и живых тканей;

- *Красным (геморрагическим)*. Красный цвет инфаркта обусловлен пропитыванием некротических тканей кровью, как это бывает при инфарктах лёгкого на фоне их хронического венозного полнокровия.

# Микроскопические и ультраструктурные признаки некроза

- Ранние стадии некроза можно диагностировать лишь с использованием специальных методов, таких как поляризационная и люминесцентная микроскопия с окраской акридиновым оранжевым, гистохимических методик (ШИК-реакция) и электронная микроскопия.

- Микроскопические признаки некроза выявляются как в изменениях ядра, так и в цитоплазме клеток. В ядрах последовательно развиваются следующие процессы, связанные с активацией гидролаз – рибонуклеаз и дезоксирибонуклеаз:
  - *Кариопикноз* – сморщивание;
  - *Кариорексис* – распад на глыбки;
  - *Кариолизис* – расплавление.

- В цитоплазме последовательно происходят денатурация и коагуляция белков, сменяемая обычно колликвацией:
- *Коагуляция* цитоплазмы;
- *Плазморексис* – распад цитоплазмы на глыбки;
- *Плазмолис* – растворение органелл.

- При фокальных (очаговых) некротических изменениях говорят о фокальном колликвационном некрозе (баллонная дистрофия).
- Одна из обычных форм некроза, обусловленная нехваткой кислорода, характеризуется увеличением эозинофилии (розового цвета при окрашивании гематоксилином и эозином) цитоплазмы погибшей клетки.

# Исходы некроза

- Нередко некроз ткани или органа имеет неблагоприятный исход и приводит больного к смерти. Таковы, например, инфаркты миокарда, головного мозга, некроз коркового вещества почек, некроз надпочечников, прогрессирующий некроз печени, панкреонекроз.

- *К неблагоприятным исходам* некроза относится также гнойное расплавление, что может быть причиной прогрессирующего гнойного воспаления вплоть до генерализации инфекционного процесса и развития сепсиса.
- *Благоприятные исходы* некроза связаны с процессами его отграничения и репарации тканей, начинающимися и распространяющимися из зоны демаркационного воспаления.

- К ним относятся *организация* или *рубцевание* ( замещение некротических масс соединительной тканью), *инкапсуляция* ( отграничение некротизированного участка соединительнотканной капсулой), при этом некротические масс могут *петрифицироваться* ( пропитывается солями кальция) и *оссифицироваться* (образуется кость). На месте колликвационного некроза возникает мезоглиальный рубчик ( при небольших размерах некроза) или киста

# Клинико-морфологические формы некроза

- Клинико-морфологические формы некроза выделяют в зависимости от особенностей морфологических и структурно-функциональными особенностями органа, в котором он развивается. Различают следующие виды некроза:

- *Коагуляционный некроз* – развивается при высоком содержании белков и низком содержании жидкости в тканях, а также низкой активности гидролитических процессов в условиях высокого рН. Примером могут служить восковидный, или ценкеровский, некроз мышц (описан Ценкером) при брюшном и сыпном тифе; творожистой некроз при туберкулёзе, фибриноидный некроз при аллергических и аутоиммунных заболеваниях.

- *Казеозный* или *творожистый* некроз является разновидностью коагуляционного некроза, он получил своё название за сходство по консистенции, цвету и виду с творогом. В некротических тканях, помимо преципитированного белка, в большом количестве обнаруживаются липиды. Встречается при туберкулёзе, когда неврозу подвергается скопления клеток моноцитарного происхождения в центре гранулёмы.

- *Колликвационный некроз* развивается в тканях, богатых жидкостью с высокой активностью гидролитических ферментов. Примером может служить очаг серого размягчения головного мозга.

- Гангрена (от греч. gangranía – пожар) – некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой. При этом некротизированные ткани приобретают чёрную окраску в результате образования сульфида железа из железа гемоглобина и сероводорода воздуха. Гангрена может развиваться в различных частях тела, лёгких, кишечнике, матке. Имеется 3 разновидности гангрены – *сухая, влажная и пролежень.*

- При *сухой гангрене* ткани мумифицируются, на границе с сохранной живой тканью определяется зона демаркационного воспаления. Такая гангрена встречается в конечностях и на теле при атеросклерозе их сосудов, отморожениях, ожогах, болезни Рейно, при тяжёлых инфекциях.

- *Влажная гангрена* возникает в тканях при действии гнилостных микроорганизмов. Ткань набухает, становится отёчной, издаёт зловонный запах, демаркационная зона не определяется. Влажная гангрена встречается в лёгких, кишечнике, матке. У ослабленных корью детей влажная гангрена может развиваться на коже щёк, промежности и называется *номой* (от греч. *nome* – водяной рак).

- *Пролежень* является разновидностью гангрены трофоневротического генеза. Возникает в местах давления на кожу у ослабленных больных, страдающих сердечно-сосудистыми, инфекционными, онкологическими и нервными заболеваниями. У лежачих больных пролежни локализуются обычно на участках тела, подвергающихся наибольшему давлению.

- *Секвестр* – участок мёртвой ткани, который не подвергается аутолизу, не замещается соединительной тканью и свободно располагается среди живых тканей. Секвестры обычно вызывают развитие гнойного воспаления и могут удаляться через образующиеся при этом свищевые ходы. Секвестрации чаще подвергается костная ткань, однако секвестры изредка могут обнаруживаться и в мягких тканях.

- *Инфаркт* – сосудистый (циркуляторный) некроз, возникающий в результате ишемии ткани. Причины инфаркта – обтурация артерии тромбом, эмболом, в связи с длительным спазмом артерий, а также функциональным перенапряжением органа в условиях гипоксии.