



Mitochondrion

Golgi complex

Peroxisome

**Leziunile tisulare / celulare ireversibile:
necroza, apoptoza.**

Nucleus

Endoplasmic reticulum

Plasma membrane

Ribosomes

Tema: Leziunile tisulare/celulare ireversibile: necroza, apoptoza.

I. Micropreparate:


№ 6. Infarct lienal. (Colorație H-E.).

Indicații:

1. Zona de necroză fără nuclee (*carioliză*).
2. Zona de demarcație:
 - a) vase hiperemiate;
 - b) infiltrație leucocitară.
3. Țesut lienal normal.

În preparat se observă o zonă omogenă, astructurată, colorată eozinofil în roz (detritus), celulele sunt fragmentate sau dezintegrate (citorexis și citoliză), nucleeele absente (carioliză); la periferia acestei zone pot fi fragmente de nuclee dezintegrate (cariorexis); dintre structurile inițiale în zona de infarct se păstrează doar traveele conjunctive slab colorate; la periferia infarctului se observă o zonă de edem, hiperemie a vaselor sanguine și infiltrație cu leucocite neutrofile - inflamație de demarcație, care delimitează zona de necroză; țesutul lienal adiacent este hiperemiat.

Infarctul lienal este un infarct alb, ischemic datorită insuficienței circulației colaterale; cauzele principale sunt tromboza sau embolia unui ram al arterei lienale. Se întâlnește în ateroscleroza arterei lienale complicată cu tromboză, în ateroscleroza aortei - embolie cu trombi sau mase ateromatoase, în cazurile de tromboză a ventriculului stâng, care se poate complica cu tromboembolie, de ex., în endocardita reumatică sau infecțioasă, infarct miocardic, cardiomiopatii și a. Consecința mai frecventă a infarctului lienal este organizarea (cicatrizarea), capsula în regiunea infarctului devine îngroșată, sclerozată.



№ 6. Infarct lienal. (colorație H-E).


№ 81. Necroza cazeoasă a nodulului limfatic în tuberculoză. (colorație H-E).

Indicații:

1. Focarul de necroză cazeoasă.
2. Infiltrat inflamator (limfocite, celule epitelioide, cellule gigante).

În preparat cu ochiul liber se vede o zonă extinsă de culoare roz-roșie, la obiectivul mic această zonă este omogenă, microgranulară, astructurată, colorată intens eozinofil, nucleele lipsesc (carioliză), la periferia focarului de necroză pot fi observate fragmente de nucleu (cariorexis); în țesutul înconjurător se relevă granuloame tuberculoase în stadiu de fibroză, se întâlnesc celule gigante polinucleate Langhans.

Necroza cazeoasă se întâlnește cel mai frecvent în tuberculoză, dar se observă și în sifilis, limfomul Hodgkin, lepră, în unele granuloame micotice. Este o variantă de necroză coagulativă. Masele necrotice au consistență densă, culoare alb-gălbuie, sunt friabile, au aspect „brânzos”. Histologic zona de necroză apare amorfă, astructurată, colorată eozinofil. Este caracteristică pierderea completă a arhitectonicii țesutului, structurile celulare și tisulare dispar totalmente. Consecințele mai frecvente sunt calcificarea (petrificarea), încapsularea și organizarea.



№ 81. Necroza cazeoasă a nodulului limfatic în tuberculoză. (colorație H-E).


№ 153. Pancreonecroză. (colorație H-E).

Indicații:

1. Focar de necroză a țesutului glandular.
2. Focar de necroză a țesutului adipos.
3. Țesutul pancreatic adiacent.

În preparat se relevă focare de necroză a parenchimului pancreatic colorate intens, în care structura este ștearsă, elementele structurale sunt dezintegrate, resturile necrotice sunt infiltrate cu leucocite neutrofile, se observă fragmente de nuclee (cariorexis), în focarele de necroză a țesutului adipos intrapancreatic adipocitele necrozate au citoplasma colorată bazofil, sunt tumefiate și prost conturate, țesutul pancreatic înconjurător este edemațiat, hiperemiat.

Steatonecroza (necroza grasă) – necroza țesutului celuloadipos. Este o formă de necroză enzimatică cauzată de acțiunea lipazei și tripsinei, care sunt eliberate din celulele acinare pancreatice în cazurile de pancreatită (pancreonecroză) acută. Lipaza pătrunde în adipocite, induce necroza lor și transformarea lipidelor în săpunuri (săruri de calciu ale acizilor grași), care macroscopic redau focarelor necrotice aspect de pete de stearină de culoare alb-gălbuie, consistență densă, bine conturate. În pancreatitele acute focare de steatonecroză se observă în pancreas, țesutul peripancreatic, oment, epiploon și în țesutul adipos din alte zone. Microscopic adipocitele devin neclare, cu contururile șterse, sunt colorate bazofil (în albastru) datorită conținutului crescut de săruri de calciu. Se întâlnește la fel și în traumatismele țesutului adipos, de ex., al glandei mamare.



№ 153. Pancreonecroză. (colorație H-E).


№ 2. Necroza epiteliului tubilor renali contorți. (colorație H-E.).

Indicații:

1. Tub necrotizat.
 - a) celulele epiteliale lipsite de nucleu (*carioliză*);
 - b) lumenul stenoizat.
2. Tub nemodificat.
3. Glomerul nemodificat.

Celulele epiteliale ale tubilor contorți proximali și distali sunt tumefiate, nu conțin nucleu (*carioliză*), citoplasma este omogenizată, de culoare roz (*eozinofilă*); lumenul tubilor este îngustat, iar în unii lipsește complet din cauza obturării cu mase de detritus celular (*plasmorexis* și *plasmoliză*); vasele sanguine sunt dilatate și hiperemiate, structura celulară a glomerulilor, a anselor Henle și a tubilor colectori se păstrează.

Necroza epiteliului tubilor renali contorți (nefroza necrotică) apare ca urmare a tulburărilor hemodinamice (ischemia corticală a rinichilor) sau a acțiunii toxice directe asupra nefrocitelor a diferitelor substanțe chimice (biclorură de mercur, etilenglicol etc). Clinic se manifestă prin insuficiență renală acută (oligurie sau anurie). Se întâlnește în stările de șoc (traumatic, cardiogen, toxic, bacterial, hemoragic, posttransfuzional, etc). Consecințele eventuale ale nefrozei necrotice: vindecarea (regenerarea tubilor renali) și restabilirea diurezei sau sfârșitul letal prin uremie.



№ 2. Necroza epitelului tubilor renali contorți. (colorație H-E).

II. Macropreparate:

№ 141. Infarct ischemic lienal.

Pe suprafața de secțiune a splinei se observă focare de necroză de formă triunghiulară (conică), de culoare alb-gălbuie și consistență densă, bine delimitate de țesutul adiacent, având baza orientată spre capsula organului și vârful spre hil (datorită ramificării „în evantai” a arterei lienale); capsula este acoperită cu depozite de fibrină (inflamație fibrinoasă), ceea ce provoacă clinic dureri în hipocondrul stâng [*aspectul microscopic – micropreparatul № 6*].

№ 151. Gangrena uscată a mîinii (piciorului).

Țesuturile moi ale piciorului (mîinii) sunt uscate, zbârcite, mumificate, de culoare neagră, consistență densă; între țesutul viabil și zona de gangrenă se evidențiază linia de demarcație (inflamație de demarcație).

Gangrena se dezvoltă în țesuturile (organele), care vin în contact cu mediul extern. Culoarea neagră se datorează sulfidului de fier, care se formează în urma contactului pigmentilor hemoglobinogeni cu aerul atmosferic și hidrogenul sulfurat produs de bacterii în țesuturile mortificate. În cursul inflamației de demarcație poate avea loc erodarea progresivă a țesutului necrozat cu detașarea lui completă – autoamputație. Cauzele mai frecvente ale gangrenei membrilor, în primul rând a celor inferioare, sunt tromboza sau tromboembolia arterelor în ateroscleroză, diabetul zaharat, endarterita obliterantă, precum și traumatismele, arsurile, degerăturile. În cazul asocierii unei infecții bacteriene gangrena uscată poate trece în gangrenă umedă datorită lichefierii țesuturilor sub acțiunea enzimelor proteolitice ale bacteriilor și leucocitelor.



№ 141. Infarct ischemic lienal.



№ 151. Gangrena uscată piciorului.

№ 131. Pancreonecroză (pancreatită necrotică acută).

În pancreas se observă focare de hemoragii de culoare roșie-închisă și focare de necroză a țesutului adipos atât intra- cât și peripancreatic de culoare alb-gălbuie, care au aspect de stearină (focare de steatonecroză).

Pancreonecroza sau pancreatita acută necrotică este o patologie acută din domeniul urgențelor medicale („abdomen acut”), în care are loc distrugerea proteolitică a țesutului pancreatic și a țesutului adipos (steatonecroză) sub acțiunea enzimelor pancreatice hiperactivate, în primul rând a tripsinei și lipazei (autodigestie). Cele mai frecvente cauze sunt afecțiunile căilor biliare și alcoolismul. Cea mai gravă complicație este șocul enzimatic, care poate cauza decesul.

№ 43. Necroză cazeoasă în tuberculoză (pneumonie cazeoasă).

În plămân se observă o zonă extinsă, neaerată, de culoare alb-gălbuie, cu aspect friabil, sfărâmicios, asemănătoare cu brânza uscată, de aici și denumirea de pneumonie cazeoasă (lat. caseum – brânză). Necroza cazeoasă este caracteristică pentru tuberculoză. Pneumonia cazeoasă se întâlnește mai frecvent în tuberculoza secundară, dar poate fi și în cea primară. Pe pleură sunt depozitate de fibrină. Masele cazeoase pot fi supuse lizei purulente și lichefierii cu apariția unor cavități de descompunere – caverne (tuberculoza cavernoasă).



№ 131. Pancreonecroză (pancreatită necrotică acută).



№ 43. Necroză cazeoasă în
tuberculoză (*pneumonie cazeoasă*).


№ 13. Cicatrice postinfarctică în miocard (*cardioscleroză macrofocală postinfarctică*).

Pe secțiunea peretelui ventriculului stâng se observă o zonă de țesut fibroconjunctiv cicatricial, de culoare alb-cenușie, cu aspect cartilaginos, consistență dură, peretele ventriculului este hipertrofiat.


Cardioscleroza macrofocală este o consecință a infarctului miocardic, apare în urma organizării zonei de infarct, care se produce în decurs de 6-7 săptămâni de la debutul bolii. În zona cicatricei postinfarctice se pot depozita săruri de calciu, în mușchiul cardiac adiacent se observă hipertrofie compensatorie. Complicațiile posibile: insuficiență cardiacă congestivă, tulburări de ritm și de conducere, anevrism cardiac cronic.




№ 13. Cicatrice postinfarctică în miocard (*cardioscleroză macrofocală postinfarctică*).




Cariopicoza și cariorexisul țesutului limfoid.




Necroza ceroasă (Zencker) a mușchiului striat. (Colorație H-E).



Necroza coagulativă a miocardului.



Sechelele a necrozei coagulative a miocardului.



Ramolismet ischemic cerebral.


Multiple, old, cerebral infarcts in a 34 year old patient with healed bacterial endocarditis of the mitral valve.




Sechelele infarctului cerebral.



**Necroza cazeoasă a
nodulului limfatic în
tuberculoză.**



**Necroza cazeoasă a nodulului
limfatic în tuberculoză.
(colorație H-E).**





Necroza cazeoasă în plămâni.



Gangrena umedă a piciorului.




Decubitus (escare).






Sechestrus
osos.



Gangrena intestinului subțire.



Necroza

- Necroza este o formă de moarte celulară caracterizată prin pierderea integrității membranei celulare și difuziunea componentelor în spațiul extracelular, proces care culminează cu dezintegrarea celulei.

- Necroza se caracterizează prin modificări ale citoplasmei și ale nucleilor celulelor afectate. **Modificări ale citoplasmei** – celulele necrotizate au hipereozinofilie (culoare datorată colorantului eozină – litera E din colorația cu hematoxină-eozină H-E, atribuită creșterii fixării eozinei de proteinele citoplasmice denaturate și pierderii bazofiliei normale dată de acidul ribonucleic (ARN) din citoplasmă (bazofilia reprezintă colorarea în albastru dată de colorantul hematoxină – litera H din H-E).

- Spre deosebire de celulele viabile, celula necrotizată poate avea un aspect sticlos, omogen, mai ales din cauza pierderii particulelor de glicogen. Corpii lipidici lamelari sunt mai proeminenți la nivelul celulelor necrotizate decât în leziunea reversibilă.

- Atunci când enzimele au digerat organitele citoplasmatiche, citoplasma capătă un aspect vacuolar, ca "mâncată de molii". La microscopie electronică celulele necrotizate au discontinuități ale membranei celulare și ale organitelor, dilatări marcate ale mitocondriilor, cu apariția de mase amorfe mari, rupturi ale lizozomilor și corpi lipidici intracitoplasmatici.

- **Modificări ale nucleului** – îmbracă unul din următoarele trei aspecte, toate determinate de dezorganizarea ADN-ului și cromatinei. Bazofilia cromatinei se poate estompa (**carioliza**), probabil secundar activității dezoxiribonucleazei (DN-aza). Un al doilea aspect este **picnoza**, caracterizată prin reducerea în dimensiuni a nucleului și accentuarea bazofiliei, situație în care ADN-ul se condensează într-o masă solidă contractată.

- În al treilea model, **carioresis**, nucleul picnotic suferă fragmentări. După 1-2 zile, nucleul din celula moartă poate dispărea complet. Celulele necrotizate pot persista o perioadă de timp, sau pot fi digerate de enzime, pentru a dispărea ulterior. Celulele moarte pot fi înlocuite de corpi lipidici, care fie sunt fagocitați de alte celule, fie sunt degradați până la stadiul de acizi grași. Acești acizi grași se leagă de sărurile de calciu, ducând la calcifierea celulelor moarte.

Tipurile de necroză

- **Necroza de coagulare** este o formă de necroză în care se păstrează arhitectura tisulară timp de cel puțin câteva zile. Țesuturile afectate au o textură fermă. Probaril, leyiunea produce nu numai denaturarea proteinelor structurale, ci și a enzimelor, blocând astfel proteoliza în celulele moarte. Ca urmare, aceste celule anucleate, eozinofile, pot persiste câteva zile sau săptămâni.

- În focarul de necroză sunt recrutate leucocitele, iar celulele moarte vor fi digerate prin acțiunea enzimelor lizozomale ale leucocitelor. Detritusurile celulare sunt apoi înlăturate prin fagocitoză. Necroza de coagulare este caracteristică **infarctelor** (zone de necroză ischemică) tuturor organelor solide, cu excepția creierului.

- Infarctul este o necroză vasculară (ischemică), ca urmare și manifestare extremă a ischemiei. Este cea mai frecventă formă a necrozei. Aspectul exterior (forma, dimensiunile, culoarea) și consistența infarctului pot fi variate.

- Mai frecvent infarctul are o formă conică cu baza orientată spre capsula organului, iar vârful spre hilul acestuia. Așa infarcte se dezvoltă în splină, rinichi, plămâni în legătură cu specificul angioarhitectonicii acestor organe – tipul magistral de ramificare a arterelor.

- Mai rar infarctul are o formă neregulată. Astfel de infarcte se întâlnesc în cord, creier, intestin – organe în care predomină nu tipul magistral, dar cel difuz sau mixt de ramificație a arterelor. Infarctul poate cuprinde o mare parte de organ sau un organ întreg (infarct subtotal sau total) sau se depistează numai la examenul microscopic (microinfarct).

- Dacă infarctul evoluează după tipul necrozei de coagulare țesutul mortificat se indurează și se deshidratează (infarctul miocardic, renal, lienal), iar dacă infarctul se dezvoltă după tipul de necroză umedă zona afectată se rãmolește și se lichefiază (infarctul cerebral, intestinal).

- **Necroza de lichifiere** se observă în infecțiile bacteriene localizate, sau uneori în cele fungice, deoarece microbii stimulează acumularea celulelor inflamatorii, iar enzimele leucocitare degradează (lichifiază) țesutul. Din motive necunoscute, moartea prin hipoxie a celulelor sistemului nervos central determină necroză de lichifiere.

- În funcție de aspectul exterior (în special culoarea) se disting trei tipuri de infarct:

Infarct alb (ischemic)

Infarct roșu (hemoragic)

Infarct alb cu lizireu hemoragic

- Infarctul alb reprezintă o zonă de culoare alb-gălbuie, bine delimitată de tesutul adiacent. Apare de obicei, în organele cu circulație colaterală insuficientă. Cel mai des se întâlnește în splină și rinichi.

- Infarctul alb cu lizireu hemoragic apare ca un focar de culoare alb-gălbuie circumscris de o zonă de hemoragii punctiforme. Această zonă se formează în legătură cu faptul că spasmul vaselor de la periferia infarctului este succedat de dilatarea lor paralytică cu apariția hemoragiilor. Astfel de infarct se observă în cord și rinichi.

- Infarctul roșu este condiționat de îmbibiția zonei de necroză cu sânge, are culoarea roșie-închisă sau vișinie, este bine delimitat. O condiție favorabilă pentru astfel de îmbibiție hemoragică reprezintă staza venoasă. Un anumit rol în dezvoltarea infarctului roșu îi revine particularităților angioarhitectonicii organului (anastomoze dintre artera bronșică și cea pulmonară). Infarctul hemoragic se întâlnește în plămâni, mai rar în intestine, splină, rinichi.

- Indiferent de patogeneză, celulele moarte sunt complet degradate, cu transformarea țesutului într-o masă de lichid vâscos. În final, țesutul descompus este îndepărtat prin fagocitoză. Dacă procesul a fost inițiat de o inflamație acută, ca în cazul infecției bacteriene, materialul este de culoare galben cremos și poartă denumirea de puroi.

- **Necroza gangrenoasă** nu reprezintă o formă distinctivă de moarte celulară, termenul este în continuare utilizat frecvent în practica medicală. Este caracteristic țesuturilor care au contact cu mediul ambiant. De obicei se referă la afectarea unui membru, în general membrilor inferiori, care și-a pierdut aportul sanguin și a suferit o necroză de coagulare cu implicarea mai multor straturi tisulare.

- Atunci când se suprapune o infecție bacteriană, necroza de coagulare se modifică prin acțiunea de lichefiere a bacteriilor și a leucocitelor recrutate (cu apariția gangrenei umede).

- **Necroza de cazeificare** se întâlnește cel mai frecvent în focarele de infecție tuberculoasă. Cazeos înseamnă “asemănător brânzei” și se referă la aspectul friabil alb-gălbui al zonei de necroză. La examinarea microscopică, focarul necrotic se prezintă sub forma unei colecții de celule fragmentate sau lizate, cu aspect granular amorf, eozinofil(roz) la colorația cu hematoxină-eozină.

- Spre deosebire de necroza de coagulare, structura tisulară este complet afectată, iar contururile celulare nu se pot distinge. Zona de necroză de cazeificare este adesea mărginită de o reacție inflamatorie specifică. Acest aspect este caracteristic unui focar inflamator denumit granulom.

- **Steatonecroza** se referă la arii focale de distrugere adipoasă și este cauzată de eliberarea lipazelor pancreatice activate în parenchimul pancreasului și în cavitatea peritoneală. Fenomenul este întâlnit în pancreatita acută, care constituie o urgență abdominală cu potențial fatal.

- În pancreatita acută, enzimele pancreatice eliberate din celulele acinare și ductele pancreatice lichefiază membranele adipocitelor din peritoneu, iar lipazele descompun esterii de trigliceride conținuți de adipocite.

- Acizii grași rezultați se combină cu calciu și produc zone albe asemănătoare cretei, care sunt vizibile macroscopic (soaponificarea grăsimilor) și permit chirurgului și medicului patolog să identifice leziunile. La examinarea histologică, focarele de necroză conțin umbre de adipocite necrotizate, cu depozite bazofile de calciu, înconjurată de o reacție inflamatorie.

- **Necroza fibrinoidă** este o formă specială de necroză, vizibilă prin microscopia optică, de obicei în reacțiile imune în care se depozitează complexe antigen-anticorp în pereții arteriali. Depozitele de complexe imune împreună cu fibrina extravazată din vase produc pe preparatele colorate cu H-E un aspect amorf, de culoare roz strălucitor, numit de către medicii patologi fibrinoid (asemănător fibrinei).