

Procesele de adaptare și compensare.

Procesele de adaptare și compensare.


Nº 150. Cardioscleroză macrofocală postinfarctică. (Colorație picrofuxină (van Gieson)).

Indicații:

1. Fascicule de țesut fibroconjunctiv.
2. Cardiomioice hipertrofiate.

În preparat se observă focare extinse de țesut fibroconjunctiv cicatricial, fibrele colagene sunt colorate în roșu cu fuxină, iar cardiomioicele în galben cu acid picric, nucleele maroniu-negru; țesutul conjunctiv este sărac în vase sanguine și elemente celulare, pe alocuri omogenizat, hialinizat. Cardiomioicele localizate imediat în jurul cicatricei sunt hipertrofiate, diametrul mărit, nucleele mari, de formă neregulată, colorate intens cu hematoxilină.

Cardioscleroza macrofocală postinfarctică se dezvoltă în urma organizării – înlocuirii cu țesut conjunctiv a zonei de infarct miocardic. Organizarea este cea mai frecventă consecință a infarctului de orice localizare. Masele necrotice sunt supuse fagocitozei de către leucocite și macrofage, iar în zona de necroză pătrunde țesut conjunctiv Tânăr – țesut de granulație, care treptat se transformă în țesut fibroconjunctiv matur, cicatricial. Acest proces durează în medie 5-7 săptămâni de la debutul infarctului miocardic. Potențialul contractil al inimii după vindecarea infarctului se restabilește prin hipertrofia regenerativă a porțiunilor restante ale miocardului, în primul rând perifocale, dar și la distanță. Complicațiile posibile: insuficiență cardiacă congestivă, tulburări de ritm și de conducere a inimii, anevrism cardiac cronic postinfarctic.



№ 150. Cardioscleroză macrofocală postinfarctică. (Colorație picrofuxină (van Gieson)).


Nº 36. Hipertrofia compensatorie a miocardului. (Colorație H-E.).

Indicații:

1. Cardiomiocite hipertrofiate.
2. Nuclee mărite în dimensiuni, intens colorate.
3. Cardiomiocite nemodificate.
4. Stroma fibroconjunctivă a miocardului.

Cea mai mare parte a cardiomiocitelor sunt mărite în volum, nucleele la fel mărite, colorate intens bazofil (hipercromatoză), au formă neregulată, printre cardiomiocele se observă fascicule subțiri de țesut conjunctiv fibrilar.

Hipertrofia miocardului se produce nu prin hiperplazie celulară, dar prin hiperplazia și hipertrofia organitelor intracelulare, ceea ce duce la creșterea în volum a cardiomiocitelor preexistente. Concomitent are loc proliferarea structurilor fibrilare ale stromei, a ramurilor intramiocardice ale arterelor coronariene, a elementelor sistemului nervos intramural al inimii.



Nº 36. Hipertrofia compensatorie a miocardului. (*Colorație H-E.*).

II. Macropreparate:

Nº 4. Hipertrofia ventriculului stâng al inimii.

Dimensiunile și masa inimii sunt mărite, peretele ventriculului stâng îngroșat considerabil, grosimea până la 2,0- 2,5 cm (grosimea normală 1,0-1,2 cm); sunt măriți în dimensiuni și mușchii papilateri și trabeculari, masa inimii poate atinge 600-1000 g (masa normală 260-280 g).

Hipertensiunea ventriculului stâng se întâlnește în hipertensiunea arterială, stenoza aortică și alte valvulopatii cardiace. Hipertrofia se produce datorită suprasolicitării funcționale a miocardului ventriculului stâng în condiții de obstacol crescut în cazul stenozei orificiului aortei sau în hipertensiunea arterială. În perioada de compensare se observă hipertrofia concentrică a inimii, când cavitățile ei sunt îngustate, iar tonusul mușchiului cardiac crescut. În perioada de decompensare are loc hipertrofia excentrică, când cavitățile inimii sunt dilatate, consistența miocardului flască, pe secțiune cu aspect opac datorită leziunilor distrofice, se observă steatoza miocardului („inimă tigrată”). Hipertrofia atinge un nivel, când mușchiul cardiac hipertrofiat nu mai poate compensa necesitățile funcționale mărite și se dezvoltă insuficiența cardiacă. Dilatarea inimii în stadiul de compensare se numește activă sau tonogenă, iar în decompensare - pasivă sau miogenă. Decompensarea inimii stângi se manifestă prin congestie pulmonară.




Nº 4. Hipertrofia ventriculului stâng al inimii.

Nº 20. Atrofia brună a inimii.

Inima este micșorată în dimensiuni și masă, are o culoare brună, epicardul nu conține țesut adipos, arterele coronariene proeminează sub epicard, având aspect șerpitor; se observă discordanță dintre dimensiunile mult mai mici ale inimii comparativ cu vasele magistrale (aorta și artera pulmonară).

Atrofia brună a inimii se întâlnește în unele boli cașectizante și în procesul de îmbătrânire ca expresie a atrofiei generale. Culoarea brună se datorează acumulării pigmentului lipofuscină, care se numește „pigment de uzură sau pigmentul senilității” și se acumulează predominant în inimă, ficat și creier.



Nº 20. Atrofia brună a inimii.

Nº 88. Hidronefroză.


Bazinetul renal și calicele sunt dilatate, mucoasa îngroșată, sclerozată, parenchimul renal efilat, atrofiat.

Hidronefroza (uronefroza) – acumularea excesivă de urină în bazinetul renal, care duce la atrofia prin compresiune a țesutului renal. Dacă procesul este unilateral atrofia poate avansa până la dispariția totală a parenchimului renal, rinichiul transformându-se într-un sac cu peretei subțiri, doar la examenul microscopic în peretei se pot depista careva resturi de țesut renal atrofiat și sclerozat. Cauza principală a hidronefrozei sunt calculii renali (urolitiază/nefrolitiază), care provoacă obstrucția ureterului, retenția urinei și dilatarea bazinetului și calicelor. Se poate întâlni în cazul compresiunii ureterului de tumorii, aderențe.

Nº 123. Hidrocefalie.

Creierul este mărit în dimensiuni, ventriculele laterale considerabil dilatate, țesutul cerebral atrofiat.

Hidrocefalia – acumularea excesivă a lichidului cefalorahidian în sistemul ventricular, cauza fiind stenoza găurii Monro și a apeductului Sylvius, a găurilor Magendie și Luschka. În acesta cazuri sistemul ventricular nu comunică cu spațiul subarahnoidian (hidrocefalie necomunicantă), are loc retenția lichidului cefalorahidian în ventricule, creșterea presiunii intraventriculare și intracraniene și atrofia prin compresiune a țesutului cerebral. Se poate dezvolta în urma leptomeningitelor, tumorilor encefalice, traumatismelor SNC. Se întâlnește și hidrocefalie comunicantă, cauzată de hiperproducția de lichid cefalorahidian, de ex., în papilom al plexurilor coroide sau de reabsorbția redusă a lichidului ca urmare a leptomeningitelor, hemoragiilor subarahnoidiene și a. Hidrocefalia poate fi o malformație congenitală a sistemului nervos central.




Nº 88. Hidronefroză



Nº 123. Hidrocefalia.




Caşexie.



Normal

Atrofiat


Atrofia ischemică bilaterală a creierului.





Norma.

Glanda mamară.

Hiperplazie.




Hipertrofia fiziologică a uterului.








**Hiperplazie endometrială
(colorație H-E).**




Hiperplazia nodulară a prostatei.








Organizarea exsudatului din alveolele pulmonare.


Încapsularea focarului de necroză cazeoasă în tuberculoză.






Metaplazia epitelului
respirator.





Displazia epitelului ectocervical.






Cicatrice cheloidiană.



Exostoză osoasă




**Calus osos viciosus în
fractura femurului**




Țesut de granulație.




Regenerarea ficatului în ciroză





**Cardioscleroză macrofocală postinfarctică.
Hipertrofie regenerativă.**





Hipertrofia


Fiziologică

Exerciții fizice


Adaptivă

Patologică

Compensatorie




concentrică



**Hipertrofia ventriculului stîng
al cordului.**




excentrică



Celula trebuie să se adapteze la modificările mediului

Adaptarea fiziologică de obicei reprezintă răspunsul celular la stimuli fiziologici

(hormoni sau substanțe chimice endogene)



Răspunsul celular la leziune

- **Adaptarea (reversibilă):**

- Edem celular
- Hipertrofia, Hiperplasia, Atrofia, metaplasia si displasia
- Acumulări celulare - hialin, lipide, etc.

- **Necroza (ireversibile):**

- Coagulativă–Infarct
- Colicvatica-Creier, absces
- Cazeoasă-Tuberculoză
- Gangrena
- Lipidică (pancreas)

Procesele adaptive -

procesele, în care predomină elementele de adaptare a structurilor celulare (tisulare) la anumite condiții noi, modificate de activitate funcțională. Este o manifestare a interrelațiilor organismului cu mediul ambiant și reflectă diferite stări funcționale – hiper, hipo funcția sau dereglarea funcției ţes. sau organismului.

Principalele procese adaptive:

- 1) atrofia;
- 2) hipertrofia (hiperplazia) adaptativă;
- 3) organizarea (încapsularea);
- 4) restructurarea morfologică a ţesuturilor
(acomodarea histologică);
- 5) metaplazia;
- 6) displazia




Figure 5-1 Adaptive tissue (*large circles*) and cell responses involving a change in number (hyperplasia), cell size (hypertrophy and atrophy), cell type (metaplasia), or size, shape, and organization (dysplasia).

Atrofia - procesul de micșorare a volumului celulelor, țesuturilor, organelor cu scăderea activității lor funcționale.

Poate fi fiziologică și patologică, generală și locală.

Atrofia fiziologică se observă în diferite perioade de vârstă, de ex.

- *atrofia vaselor ombilicale la nou-născuți,*
- *atrofia canalului arterial (ductului Botallo) în primele 3 luni de viață extrauterină,*
- *atrofia glandelor sexuale, a pielii, oaselor și altor țesuturi (organe) la bătrâni*

Atrofia patologică generală sau cașexia

(de la grec. *kakos* – rău, *hexis* - stare):

- 1) **cașexia alimentară;**
- 2) **cașexia canceroasă;**
- 3) **cașexia endocrină (*hipofizei, tiroidei*);**
- 4) **cașexia cerebrală (*procese inflamatoare sau tumorale în regiunea hipotalamusului*);**
- 5) **cașexia în unele boli infecțioase cronice (*tuberculoză, dizenterie cronică, S.I.D.A.*)**


Cașexia

- Se observă slăbirea pronunțată, lipsa țesutului celuloadipos subcutanat, mușchii sunt atrofiați, pielea uscată, flască .
- *Macroscopic*, forma organelor este pastrata, masa și volumul sunt micșorate, cu diminuarea funcției lor, culoarea este modificata (scade cantitatea de sange), în deosebi în miocard și ficat , se acumulează pigmentul lipofuscina, care le imprimă culoarea brună.

Atrofie bruna

Este caracterizata prin depunerea de pigment de uzura sau a senilității (lipofuscina) in involutii senile, denutritie simpla sau boli cronice.

- *Macroscopic* - organele sunt atrofiate, de nuanta cafenie cu cat contin mai putin sange.
- *Microscopic* - lipofuscina se depune mai ales in neuroni (chiar de la o varsta nu prea mare); in miocard (central, la capetele nucleilor in zona de sarcoplasma fara miofibile); in hepatocite (in jurul nucleilor).





Clasificarea atrofiei locale patologice:

Atrofia disfuncțională:

este cauzată de inactivitate, scăderea sau suspendarea activității funcționale a organului - A. musculară și osteoarticulară: imobilizare prin aparat gipsat;

- A. marginii alveolare după căderea dintilor;
- A. tubilor renali după obliterarea glomerurilor în ateroscleroza (ASC) renală.
- A. colecistul prin obstrucție totală datorită unui calcul inclavat în ductul cistic



Atrofia Neurotică


Apare în urma tulburării inervației trofice în cadrul bolilor cu leziuni predominant destructive în țesutul nervos:

- a) traumatisme cu lezarea nervilor motori, tumori nervoase.
- b) poliomielita (paralizie spinală infantilă) cu liza corpusculilor Nissl și neuronofagiea neuronilor din coarnele anterioare ale maduvei spinarei; muschii striati nu mai primesc incitatii motorii conduce în timp la atrofie musculară și a scheletului.
- c) miopatii cu leziuni ale neuronilor vegetativi din nevrax.




Atrofie ischemică

- Insuficiența lent progresiva a circulației arteriale din ASC datorită îngroșării neregulate a peretilor arteriali;
- scăderea aportului de sânge arterial contribuie la aparitia Atrofiei progresive a elementelor celulare diferențiate din cortex (cel. piramide), cord (miofibrile), rinichi (corticala) care sunt înlocuite treptat de scleroza.



- **Atrofia prin compresiune** – cauzată de comprimarea mecanică a parenchimului funcțional al organului, care duce la ischemierea lui [în tumori, acumulări de lichid]
- - **hidronefroza** – dilatarea bazinei renale și a calicelor prin acumularea urinei aseptice,
- - **hidrocefalia** – acumularea de lichid cefalorahidian în cutie craniiană;



Atrofia cauzată de factori fizici și chimici - exemple:

- inhibarea proceselor regenerative și atrofia ţesuturilor hematopoietice și glandelor sexuale în urma radiației penetrante,
- atrofia glandelor endocrine la administrarea îndelungată a preparatelor hormonale



Hipertrofia



Hipertrofia - mărirea în volum și masă a celulelor, țesutului, organului.

Hiperplazia - creșterea numărului elementelor structurale ale țesutului și celulelor.

Hipertrofia unui organ (țesut) se poate produce prin multiplicarea celulelor, sau prin creșterea numărului și dimensiunilor elementelor intracelulare, sau prin asocierea ambelor acestor procese.

Varietățile de hipertrofie/hiperplazie adaptativă:

- 1) **hipertrofia neurohormonală;**
- 2) **proliferările hipertrofice.**


Hipertrofia neurohormonală (*neuroumorală*)

este un proces adaptativ (*nu compensator*) și survine în urma tulburărilor neurohormonale cu modificarea balanței hormonilor, care exercită o acțiune stimulatoare asupra creșterii organelor și țesuturilor.

Exemple:

- **hipertrofia uterului și a mamelelor** în cursul sarcinii și lactației sub acțiunea hormonilor placentari și ai corpului galben ovarian;
- **acromegalia** - hipertrofia și creșterea neproporțională a mâinilor, picioarelor, mandibulei, urechilor, nasului cauzată de hipersecreția hormonului somatotrop în adenom eozinofil al hipofizei (la copii, adolescenți - gigantism);
- **hiperplazia glandulară a endometrului** în urma hipersecreției de hormoni estrogeni;

- **ginecomastia** = hipertrofia glandelor mamare la bărbați cauzată de hipofuncția testiculelor (hiposecreție de testosterone);
- **hiperplazia nodulară a prostatei** la bărbați de vârstă înaintată, modificarea echilibrului androgeni/estrogeni.



Proliferările hipertrofice duc la mărirea în dimensiuni a ţesuturilor și organelor; au origine diversă.

Exemple:

- **dezvoltarea polipilor hiperplastici** pe membranele mucoase în inflamația cronică;
- **dezvoltarea elefantiazisului** în limfostaza cronică;
- **pseudohipertofie sau hipertrofie falsă** - proliferarea ţesutului adipos și conjunctiv în cazurile de atrofie parțială sau totală a organului, de ex., în atrofia rinichilor, a mușchilor scheletali;
- **proliferarea intimei vaselor sanguine** în cazul scăderii presiunii în vase;

Organizarea - substituirea cu țesut conjunctiv a unor focare de necroză, a exsudatelor, trombilor, hematoamelor, defectelor tisulare, paraziților, corpilor străini;

în cursul procesului de organizare se produce înlăturarea maselor necrotice, fibrinei, exsudatelor, produselor de dezintegrare a țesuturilor și înlocuirea lor cu țesut de granulație.

Încapsularea - delimitarea focarului necrotic, infarctului, corpului străin, parazitului etc. prin membrană fibroconjunctivă

Restructurarea morfologică a țesuturilor sau acomodarea histologică - reacția de adaptare a țesuturilor la condiții noi de funcționare.

Exemple:

- dilatarea și hipertrofia pereților vaselor sanguine colaterale în cazul tulburării circulației sângei în vasele magistrale;
- transformarea epitelului plat alveolar în epiteliu cubic în atelectazii;
- transformarea nefroteliului capsulei glomerulului renal în epiteliu cubic în cazul sclerozei și hialinozei glomerulului;
- îngroșarea oaselor craniene în cazul atrofiei creierului (se mai numește *hipertrofia ex vacuo*)

Metaplia este transformarea unui țesut adult diferențiat într-un alt tip de țesut adult, de asemenea bine diferențiat. Este un proces de adaptare a țesuturilor la condiții modificate de funcționare. Trecerea unui țesut în altul are loc doar în limitele uneia și aceleiași foite embrionare prin proliferarea celulelor tinere. Se întâlnește mai frecvent în epiteliiile de înveliș și în țesuturile conjunctive.

Metaplazia este un proces reversibil.

Cauzele:

- iritații și inflamații cronice,
- avitaminoza A (*deficiența vitaminei A induce metaplazia epitelului, iar excesul stopează keratinizarea*).

Cel mai frecvent se întâlnește metaplazia epidermoidă (scuamoasă) a epitelului glandular, când epitelul respectiv este substituit cu epiteliu scuamos stratificat cu sau fără cornificare.

Exemple:

- metaplazia epidermoidă a epiteliului traheii sau bronhiilor la fumători,
- metaplazia epidermoidă a epiteliului canalului cervical al uterului în endocervicite cronice,
- metaplazia epidermoidă a epiteliului ducturilor excretoare ale glandelor salivare, pancreasului, căilor biliare în calculoză.

În toate aceste cazuri epiteliul scuamos stratificat, fiind mai dens, mai compact este mai rezistent la acțiunea unor factori nocivi, care pot altera epiteliul columnar specializat mai fragil.

*! Epiteliul scuamos stratificat în astfel de cazuri este **nefuncțional**.*


Metaplazia nu este considerată direct cancerogenă, dar în cazurile când factorul cauzal persistă timp îndelungat, el poate induce transformarea malignă a epiteliului metaplastic (*de ex., cancerul scuamos pulmonar debutează în focarele de metaplazie epidermoidă a epiteliului bronhiilor*).

**Metaplazia ţesutului conjunctiv cu apariţia
ţesutului cartilaginos, osos sau adipos se întâlneşte:**


- în focarele de scleroză,
- în cicatrice, aderențe,
- în stroma tumorilor,
- în capsula focarelor vindecate de necroză cazeoasă în tuberculoză etc.

*Formarea ţesutului metaplastic debutează cu
proliferarea celulelor tinere ale ţesutului conjunctiv,
care se diferențiază în condroblaști, osteoblaști,
lipoblaști.*

Metaplasia epitelului respirator




Metaplasie



A

Metaplasia epitelului esofagului



Displazia - proces patologic, care se manifestă prin tulburări pronunțate ale proliferării și diferențierii epitelului cu dezvoltarea atipiei celulare și dereglařii histoarhitectonicii lui (termen sinonim - **hiperplazia atipică**).

Principalele caracteristici:

- a) stratificarea epitelului este păstrată, dar orientarea celulelor în interiorul straturilor este modificată,
- b) pierderea polarității epiteliocitelor, uneori și a trăsăturilor specifice pentru ţesutul dat;
- c) modificări ale nucleelor celulare, creșterea dimensiunilor și hipercromazia lor;

- d) variabilitatea dimensiunilor și formei celulelor;
- e) creșterea activității mitotice, a numărului de mitoze, apariția lor în toate straturile epiteliale;
- f) membrana bazală a epitelium rămâne intactă, nealterată.

Caracteristicile enumerate demonstrează clar că displazia este mai mult o noțiune tisulară decât celulară.


Displazia se întâlnește în procese inflamatorii și regenerative, fiind o manifestare a tulburărilor proliferării și diferențierii celulelor.
Ea se observă și în epiteliile metaplaziate.

Se disting trei stadii de displazie:
I (ușoară), II (moderată) și III (severă);
limita dintre ele este uneori greu de stabilit.


Dacă imaturitatea nucleară se observă în toate straturile epitelului, inclusiv în cele superficiale, leziunea este apreciată ca severă;
dacă imaturitatea nucleară este localizată doar în straturile bazale leziunea se consideră ușoară.

Stadiile incipiente I și II ale displaziei sunt mai frecvent **reversibile**, iar stadiul III este considerat o stare de **precancer**.

Normal




Metaplasia



Displasia



Carcinoma
in situ



Procesele compensatorii –

se dezvoltă în cazurile, în care are loc alterarea organului (țesutului) sub acțiunea unor factori nocivi.

Compensarea este orientată spre corecția tulburărilor funcționale, care survin în cursul afecțiunilor.

Acest grup include:

- a) regenerarea;
- b) **hipertrofia (hiperplazia) compensatoare**

Regenerarea - procesul de refacere (reînnoire) a elementelor structurale ale ţesutului (organului) în locul celor distruse.

Are loc restabilirea atât a structurii cât și a funcției ţesuturilor (celulelor) alterate.

Forme morfologice ale regenerării:

forma celulară - multiplicarea celulelor, diviziunea lor mitotică sau amitotică;

forma intracelulară - multiplicarea și creșterea dimensiunilor organitelor citoplasmatice.

În evoluția procesului regenerativ se disting 2 faze:
1) *de proliferare* și 2) *de diferențiere*

Varietățile de regenerare:

- a) fiziologică;
- b) reparatorie;
- c) patologică.

Regenerarea fiziologică - se efectuează permanent în decursul întregii vieți și se caracterizează prin reînnoirea continuă a celulelor parenchimatoase, a elementelor fibrilare și a substanței fundamentale a țesutului conjunctiv.

Se produce la nivel subcelular, permanent având loc regenerarea biochimică (moleculară), care este echivalentul structural al funcțiilor organismului.

Regenerarea reparatorie - regenerarea care se produce în diferite procese patologice, când are loc alterarea celulelor și a ţesuturilor.

Reprezintă regenerarea fiziologică în organismul bolnav.

Debutează concomitent cu acțiunea factorului nociv.

Regenerarea reparatorie poate fi
completă (*restituție*) și
incompletă (*substituție*).

Regenerarea reparatorie completă –
înlocuirea defectului cu un țesut identic celui distrus (preexistent).

Se observă în țesuturile în care predomină forma celulară de regenerare:

- în țesutul conjunctiv,
- oase,
- piele,
- mucoasa tractului digestiv,
- mucoasa sistemului respirator,
- mucoasa căilor urogenitale,
- endoteliul vaselor,
- mezoteliul membranelor seroase,
- țesutul hematopoietic.

Regenerarea reparatorie incompletă – înlocuirea defectului cu țesut conjunctiv cicatriceal, iar restabilirea parenchimului funcțional se produce prin hipertrofia părții restante a organului denumită *hipertrofie regenerativă*.


Ultima se poate efectua pe două căi:

- 1) hiperplazia celulelor (în ficat, rinichi, pancreas, plămâni etc.);
- 2) hiperplazia și hipertrofia organitelor intracelulare, adică - hipertrofia celulelor (se observă în miocard și creier)

Regenerarea patologică: regenerarea anormală, atipică caracterizată prin modificări cantitative sau calitative ale procesului regeneativ.

Cauze: tulburări de inervație și circulatorii, carență de vitamine și proteine, inflamație cronică.

Regenerarea plăgilor



- De primă intenție
- De a doua intenție



Regenerarea plăgilor

Regenerare de primă intenție

- Apare în plăgi mici care regenerează rapid
- Regenerarea epitelială predomină asupra fibrozei
- Regenerarea este rapidă în cazul infectării minimele a plăgii

Regenerare da a doua intenție

- Este caracteristică plăgilor masive
- Fibroza predomină asupra regenerării epiteliale
- Regenerarea este mai lentă
- Exemple:
 - Infarctul
 - Combustii și ucerații

